


الصفحة رقم 31/2015/م.و.إف

## إعداد المراجع التقنية والتقنية الإقتصادية

المرحلة 3: إعداد المراجع التقنية والتقنو-اقتصادية خاصة بالسلسلة

### سلسلة الجوز



## دليل الفلاح

484-N1077-18b

نسخة نهائية

الفهرس

11	الفهرس	11
3	1. الاهمية الاقتصادية و مكانة الزراعة	3
3	2. متطلبات التربة والمناخ الخاصة بالزراعة	3
4	3. تقنيات انشاء بستان الجوز	4
4	3.1. نوع الاثمار	4
4	3.2. اختيار الشتلات	4
5	3.3. غرس الشتلات في البستان	5
6	3.4. فترة الفرس	6
6	3.5. اختيار الاصناف	6
7	3.6. حامل الطعم	7
8	3.7. كثافة الفرس	8
9	4. التقليم	9
9	4.1. تقليم التكوين	9
11	4.2. تقليم الصيانة	11
12	5. السقي	12
13	6. التسميد	13
13	7. صيانة التربة و محاربة الأعشاب الضارة	13
13	7.1. فئات الأعشاب الضارة	13
14	7.2. محاربة الأعشاب الضارة	14
14	8. التلقيح	14
15	9. امراض شجرة الجوز	15
18	10. حشرات شجرة الجوز	18
20	11. الجني والتحويل والتخزين	20
20	11.1. الجني	20
20	11.2. الانتاج	20
20	11.3. تكسير الجوز و ازالة القشرة	20
20	11.4. التسويق	20

## 1. الأهمية الاقتصادية و مكانة الزراعة

تعتبر شجرة الجوز بالمغرب شجرة مثمرة و غابوية في نفس الوقت حيث تخضع هذه الأشجار لحماية المندوبية السامية للمياه و الغابات كما ان قوانين هذه المندوبية هي التي توطر عملية قطع الأشجار. ويشهد وجود أشجار قديمة جدا في بعض المزارع التقليدية على قدم هذه الزراعة حيث تعود الى قرنين إلى 3 قرون من الزمن. كما ان انتاج الجوز له مستقبل اقتصادي كبير بسبب تزايد الطلب في الأسواق المغربية والعربية والأوروبية

وتغطي زراعة الجوز المشترك في المغرب مساحة حوالي 4500 هكتار مع إنتاج يقدر ب 7000 طن من الجوز غير المقشر.. و تتواجد اشجار على ضفاف الوديان الجبلية التي يتراوح ارتفاعها بين 1200 متر و 1700 متر مثل أزيلال، أميزميز، أوريكا، ريف، ميدلت و ريتش. ويزرع الجوز أساسا على ضفاف الوديان المائية وعلى جوانب الحقول. تزرع هذه الأشجار لإنتاج الجوز والخشب النبيل ولتوفير الظل للفلاحين خلال فترة الصيف.

تشكل شجرة الجوز بالنسبة للفلاحين وسكان الجبال موردا اقتصاديا مهما الذين يبيعون محاصيلهم في الأسواق لتسعير 0.2 الى 0.3 درهم للجوزة، بالإضافة الى بيع الخشب الذي يعرف بجودته العالية.

## 2. متطلبات التربة والمناخ الخاصة بالزراعة

تفضل شجرة الجوز التربة التي درجة حموضتها 6,5 الى 7,5. كما تفضل التربة الطينية الكلسية الغنية بالمادة العضوية بشرط ان يظل مستوى الكلس النشط أقل من 6% بالتربة (لتجنب مخاطر داء الاصفرار). و يعتبر الطين والمادة العضوية المسؤولين المباشرين عن توفر العناصر الغذائية بحيث يمثل هذان العنصران درجة خصوبة التربة.

و تلعب المادة العضوية دورا مهما في الحالة الفيزيائية للتربة حيث تسهل نمو الجذور داخل التربة، وبالتالي تعزز الإمكانيات الزراعية للبلستان. وتنتج هذه المادة العضوية عن تحلل الكائنات الحية بعد موتها في التربة (البكتيريا والحشرات وديدان الأرض ...). لتصبح الغذاء الأساسي للأشجار.

ويمكن تقييم النشاط البيولوجي الجيد للتربة بحساب بنسبة الكربون/ الأزوت (C/N). وتشير نسبة  $9 < C/N < 11$  إلى فائدة جيدة للمواد العضوية.

عند غرس شجرة الجوز يجب تجنب أنواع التربة التالية:	
•	التربة الضحلة والحجرية.
•	التربة الرملية الناعمة؛
•	التربة المشبعة بالماء و التي تحتوي على نسبة الطين مهمة جدا؛
•	التربة الكلسية التي تحتوي على نسبة الكلس النشط $< 6\%$ (خطر الإصابة بداء الاصفرار).
•	التربة التي تكون حمضية جدا، ودرجة الحموضة $> 6$ ؛
•	التربة الرطبة التي لا تحتوي على العناصر المعدنية.

المواقع الأكثر ملائمة لغرس شجرة الجوز هي الأنهار الباردة، سفوح المناطق الساحلية. ينصح بتجنب الأراضي التي تحيط بها التلال، حيث لا يمكن الهروب من الهواء البارد بسهولة. وينبغي أيضا تجنب الأراضي التي تسقط فيها مياه الأمطار المفرطة ولا يتم تصريف المياه بها بطريقة جيدة.

يعتبر الصقيع الليلي العدو الأول لشجرة الجوز خلال أواخر الربيع أو أوائل الخريف. يجب تجنب المناطق ذات الصقيع الليلي المتكرر خلال فصل الربيع. بشكل عام، لا يمكن أن تتحمل شجرة الجوز درجات الحرارة المنخفضة جدا والعالية جدا، فضلا عن الرياح قوية جدا. ارتفاع درجات الحرارة في الصيف يسبب ضررا للثمار وقد يؤدي إلى تقلص حجم الجوز.

يمكن أن تحدث بعض الأضرار الصغيرة تقريبا عند 38 درجة مئوية، ولكن يحدث تلف أكبر عندما تستمر درجات الحرارة أكبر من 42 درجة مئوية في المتوسط. ومع ذلك، من بين الأصناف المختلفة، هناك فرق كبير من حيث تحمل درجات الحرارة العالية.

معظم أصناف الجوز حساسة لدرجات الحرارة الشتوية المنخفضة للغاية. عندما تكون في طور السكون، فإنها يمكن أن تتحمل في المتوسط درجات حرارة تصل إلى -10 درجة مئوية دون أن تعاني من أضرار جسيمة




لكل صنف من الجوز متطلبات من البرودة محددة من أجل كسر سكون البراعم (يتم قياس المتطلبات من البرودة في ساعات التعرض لدرجة حرارة أقل من 7 درجة مئوية. بشكل عام، تتراوح متطلبات الجوز من 450 إلى 1500 ساعة، ولكن معظم الأصناف لديها احتياج للبرودة يتراوح بين 700 إلى 1000 ساعة. إذا كانت هذه الاحتياجات في البرد غير مرضية، سوف يكون هناك تأخير في تشكيل البرعم، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض إنتاج الثمار

وتتراوح الأمطار المرغوب فيه لهذا المحصول بين 650 و 700 مم، موزعة بشكل جيد.

### 3. تقنيات انشاء بستان الجوز

#### 3.1. نوع الاثمار

بالنسبة لشجرة الجوز، يمكن التمييز بين ثلاث انواع للاثمار:

أنواع الإثمار	الخصائص	الصورة
الإثمار في نهاية الأغصان	تتموقع البراعم التي سوف تعطي الثمار على الأغصان البالغة من العمر سنة واحدة، حيث يتمركز الإثمار في اطراف الشجرة. تتميز الاصناف ذات الاثمار النهائي بدخول متأخر في الإنتاج و باننتاجية ضعيفة حيث لا يتجاوز المردود 3 اطنان من الجوز في الهكتار الواحد.	
الإثمار في وضعية متوسطة على الأغصان	يتم الانطلاق الزهري للازهار الاناث المتواجدة بنهاية او شبة الجانبية بالأغصان التي يبلغ عمرها سنة واحدة مثل الاصناف ذات الاثمار النهائي. في فصل الربيع على طول الاغصان، نلاحظ ظهور عدد كبير من البراعم الجانبية انطلاقا من البراعم الخضرية في المواقع المتوسطة وحتى المواقع القاعدية، تتميز هذه البراعم بقوتها و باننتاجيتها حيث ستعطي في الموسم المقبل جوزا في وضعية نهائية. يعرف هذا النوع من الاثمار بدخوله السريع في الإنتاج و باننتاجية المرتفعة مقارنة مع الانواع ذات اثمار بهائي	
الإثمار على الأغصان الجانبية	تتوزع البراعم الثمرية على طول الأغصان التي يبلغ عمرها سنة واحدة. في فصل الربيع، تتحول اغلب هذه البراعم الى عسلوج سيحمل في نهايته الجوز. عندما تحصل هذه الأغصان المثمرة على الضوء الكافي تستمر في الإنتاج لعدة سنوات. تتميز هذه الأصناف بدخول سريع في الإنتاج و باننتاجية مضاعفة مقارنة باننتاجية الأصناف ذات الإثمار النهائي.	

#### 3.2. اختيار الشتلات

تعبير نوعية الشتلات أمر بالغ الأهمية لنجاح عملية غرس الجوز. يمكن للفلاح ان يختار بين أنواع الشتلات الرئيسية التالية:

✓ الشتلات المطعمة ذات الجذور العارية

أنها تأتي من التطعيم على حامل طعم تم الحصول عليه انطلاقاً من غرس البذر ويبلغ من عمر سنة واحدة، يتم زرع هذه الشتلات في المشتل بعد وضعها في غرفة ساخنة. اعتماداً على المدة التي سوف تقضيها في المشتل، يمكن التمييز بين النباتات التي تبلغ سنة واحدة والنباتات التي تبلغ سنتين.

• الشتلات التي تبلغ سنة واحدة

يبلغ طول هذه الشتلات 0.50 متر ذات شكل مخروطي و تتميز بخشب جيد بالإضافة الى توفرها على شعيرات وفيرة. تكلفة هذه الشتلات ضعيفة و تتمتع بقدرة كبيرة على الانبات و استئناف النمو في البستان شريطة يتم غرسها في البستان بطريقة صحيحة.

خلال السنة الأولى بعد الغرس، لا يتم تقليم الشتلة من أجل السماح للجذور بالنمو و ذلك بالموازاة مع نمو الأغصان. وينصح بتقليم الجذع الرئيسي خلال الشتاء الثاني من أجل نمو أغصان قوية التي ستساهم في تشكل الشجرة لاحقاً.

إذا اجتمعت الظروف الملائمة (جودة الشتلات، الري، خصوبة التربة و خبرة الفلاح) يمكن ان نقوم بقطع الجذع بعد الغرس.

• الشتلات التي تبلغ سنتين

يتم اقتلاع هذه الشتلات من المشتل عند بلوغها من العمر سنتين و يجب ان يكون طولها مترين على الأقل و تحتوي على براعم على طول الأغصان الجديدة. و يمكن لهذه الشتلات ان تصل الى طول مترين خلال السنة الأولى اذا كانت الظروف ملائمة. إذا اعطت الشجرة اوراقاً و براعم جديدة يجب قطعها بالكامل في السنة المقبلة.

إذا تمت رعاية هذه الشتلات بشكل جيد سوف نحصل على بستان متجانس.

✓ النباتات المطعمة في المشتل

نحصل على هذه الشتلات انطلاقاً من التطعيم بالبراعم الساكنة للصنف على حامل طعم ذي السنتين. يجب ان طول هذه الشتلات مترين و ان تتمتع بنمو جيد.

بعد الغرس في البستان، تكون تقنيات رعاية هذه الشتلات نفس التقنيات المتبعة بالنسبة للشتلات التي تبلغ من العمر سنتين ذات الجذور العارية.

3.3. غرس الشتلات في البستان

يتم إعداد التربة عندما تكون الأرض جافة لتجنب تمليس الجدار الداخلي للحفر في حالة اذا ما كانت التربة تحتوي على الماء، لان ذلك سيعرقل نمو الجذور.

في حالة ما اذا كان غرس الشتلات سوف يتم في نهاية فصل الشتاء، فيجب تخزين الشتلات في مكان محمي بما فيه الكفاية من الصقيع.

قبل الغرس، يتم قطع الجذور المصابة بالإضافة الى نهاية كل جذر لضمان انطلاقة جيدة كما يمكن وضع الجذور وضع جذور الشتلة في محلول يتكون من مزيج بين الماء، 2/3 طين و 1/3 روث البقر من أجل تسهيل انبات الجذور.


يمكن انجاز عملية حفر الحفر على عمق 60 سم ميكانيكياً قبل الغرس مباشرة.

عند غرس الشتلات يجب الحرص على ان تكون نقطة التطعيم فوق سطح التربة.

تتم عملية الغرس على النحو التالي



- حفر حفرة عمقها 60 سم ومحيطها 80 سم؛
- وضع الوتد في وسط الحفرة؛
- قطع الجذور الميتة أو المصابة؛
- وضع الشتلة في الحفرة بحيث يكون الوتد بين الشتلة و الرياح السائدة في المنطقة؛
- ملء الحفرة بالتربة المتبقية، يجب ان تكون هذه الاخيرة رقيقة. عند وضع التربة يجب تحريك الشتلة للسماح لها بالدخول بين الجذور ولضمان التصاق أفضل للتربة بالجذور.
- ابقاء نقطة التطعيم على ارتفاع ما بين 5 و 10 سم على الأقل بالنسبة لمستوى سطح التربة.
- عند الانتهاء من عملية الغرس، يجب الضغط على التربة بالرجل عن يمين وعن يسار الشتلة مع تجنب الدك المفرط
- انجاز الاحواض حول الشتلات ثم سقيها..



صورة 1 : رسم تخطيطي لعملية غرس شتلة الجوز

### 3.4. فترة الغرس

تتم عملية غرس اشجار الجوز خلال فصل الخريف (أواخر نونبر-بداية دجنبر)، في بداية السكون، أو في أواخر فصل الشتاء (فبراير / مارس) قبل تفتح البراعم.

### 3.5. اختيار الأصناف







مكنت الدراسات الميدانية التي أجريت في مختلف مناطق المغرب من إيجاد أنواع مختلفة من اشجار الجوز منتجة لجوزات كبيرة (الوزن: 15 غرام، الطول: 40 مم) مع نواة من 5 إلى 6 غرام متوسط الوزن.




صورة 2 : انواع الجوز التي تم جمعها خلال الدراسات الميدانية

يعرض الجدول التالي الخصائص الرئيسية لبعض أصناف الجوز الأجنبية:

جدول 1 : الخصائص الرئيسية لبعض أصناف الجوز الأجنبية

الصورة	الملقحات	نوع الإثمار	الازهار	الانتاجية	حجم و لون ثمرة الجوز	الاصل	الصف
	مايلانيز (Meylanaise) غوند دو مونتانيك Ronde de ) (Montignac	نهائي	متاخر	جيدة	كبيرة جدا	فرنسا	فرانكيت (Franquette)
	فيرميت (Femette) فرانكيت (Franquette)	جانبي	مبكر	ذات انتاجية عالية جدا	كبيرة	كاليفورنيا	تشاندر (Chandler)
	فيرميت (Femette)	نهائي	متاخر	انتاجية عالية	متوسطة الى كبيرة	فرنسا	فيرنور (Fernor)
	فرانكيت (Franquette)	جانبي	مبكر	انتاجية عالية جدا	كبيرة	فرنسا	لارا (Lara)
	فرانكيت (Franquette) و مايلانيز (Meylanaise)	نهائي	مبكر	متوسطة	كبيرة	ايطاليا	ماييت (Mayette)
	مايلانيز (Meylanaise) غوند دو مونتانيك Ronde de ) (Montignac	نهائي	متاخر	جيدة	كبيرة جدا	فرنسا	الباريسية (Parisienne)

	فرانكيت (Franquette)	نهائي	مبكر	جيدة	متوسطة الى كبيرة	فرنسا	ماربوت (Marbot)
---	-------------------------	-------	------	------	---------------------	-------	--------------------

اختيار الأصناف الملائمة ضروري من أجل ضمان الانتاجية والرياح



- ❖ يجب اختيار الأصناف الملائمة لظروف المناخية بالمنطقة.
- ❖ يجب اختيار الاصناف حسب الطلب عليها بالأسواق من أجل ضمان الربح.

3.6. حامل الطعم

بالنسبة لشجرة الجوز، يوجد حاملا طعم اثنين يمكن استعمالهما هما : جوغلانز نيغرا و جوغلانز ريجيا.

جدول 2 : المميزات الرئيسية لحاملي الطعم

جوجلانز ريجيا	جوجلانز نيغرا	حاملي الطعم
- قوة جيدة.	- اصله من أمريكا الشمالية.	المميزات
- يتميز ببداية انتاج متأخرة (في بعض الأحيان عشرة إلى اثني عشر عاما بعد الغرس)، لكن عمره يمكن ان يصل الى 100 سنة.	- قوته كبيرة.	
- ليس له تأثير على حجم الجوز للصف المصنف المطعم عليه	- يعطي ثمار قبل ج. ريجيا ولكن عمره محدود في 50 سنة.	
- مقاومته للبرد خلال فصل الشتاء أقل من جوغلانز نيغرا، في حين تبقى جيدة.	- زيادة كبيرة في حجم الجوز المصنف المطعم عليه.	
- حساس للاختناق الجذري.	- مقاومته جيدة جدا للبرد خلال فصل الشتاء.	
- حساس لنيماتود.	- حساس للاختناق الجذري.	
- حساس لنقص الحديد.	- حساس لنيماتود.	
- غير حساسة جدا لنقص الحديد.	- حساس لنقص الحديد.	
- حساس لمرض التدرن التاجي Crown gall.	- عرضة للإصابة بالفيروس لفة أوراق الكرز	
- حساس لعفن الجذر.	- غير حساس لمرض التدرن التاجي Crown gall.	
- حساس للتربة الكلسية.	- غير حساس لعفن الجذور.	
- للتربة الخصبة معتدلة، الأحجار الكريمة. مقاومة للجفاف	- غير حساس للتربة الكلسية.	
	- يتم غرسه في التربة العميقة الغنية.	
	- حساس للجفاف.	

اختيار حامل الطعم الملائم



- ❖ عند اختيار حامل الطعم، يجب الأخذ بعين الاعتبار المعايير الثلاث التالية:
  - ✓ التناسب ومواصفات البستان بما في ذلك: المواصفات الفيزيائية للتربة، مخاطر اختناق الجذور، نسبة الكلس النشط، مخاطر الإصابة بأمراض التربة والمشاكل الناتجة عن تجديد البساتين القديمة.
  - ✓ تحديد حامل الطعم الذي يتجانس والصنف المراد تطعيمه.
  - ✓ الاختيار النهائي لحامل الطعم وذلك بالارتكاز الى ثلاثة معايير: قوة النمو، شكل الهيكل العام الناتج عن حامل الطعم والصنف المطعم عليه، القيمة الزراعية للصنف.



### 3.7. كثافة الغرس


تتميز شجرة الجوز بنموها الكثيف وبتطلبها للضوء لذا يجب أن تتراوح كثافة الغرس بين 8 × 9 إلى 12 × 12.

اعتمادا على عدد الأشجار المغروسة في الهكتار الواحد، نميز بين البساتين الشبة المكثفة والمكثفة.

في الحالة الأولى، تزرع اشجار الجوز تقليديا في بساتين مفتوحة على مسافة تتراوح بين 10 و 12 مترا حيث أن عدد اشجار الجوز بالهكتار يكون منخفضا ما بين 70 إلى 100 شجرة.

في الحالة التي تقل فيها مسافة الغرس عن 10 أمتار بين الأشجار (7 إلى 8 أمتار) نتحدث عن النظام المكثف حيث يكون عدد الأشجار ما بين 150 و 200 في الهكتار الواحد. ويمكن اعتماد هذا النظام في الحالتين التاليتين:

- بالنسبة للأصناف ذات الإثمار النهائي، فإن ذلك سيقلل الفترة غير المنتجة ويضاعف المحصول خلال السنوات الأولى من الإنتاج. إلا أنه عند دخول الأشجار في منافسة فيما بينها يجب أن يتم التخلص التدريجي شجرة واحدة من اثنتين.
- بالنسبة للأصناف ذات الإثمار الجانبي التي يسمح شكلها بالتقليم المحور، لن يكون من الضروري إزالة الأشجار.

كثافة الغرس	
❖ اختيار كثافة الغرس الملائمة لتجنب الدخول غير الكافي للضوء والمنافسة الكبيرة بين الأشجار فيما يخص العناصر المغذية والماء مما يؤدي إلى ثمار ذات أحجام صغيرة وذات لون شاحب، و للحد من الأمراض والحشرات التي تصيب الأشجار	

### 4. التقليم

#### 4.1. تقليم التكوين

يتم تحديد تقليم التكوين الأنسب لشجرة الجوز حسب نوع الإثمار وهيكل الشجرة.

بالنسبة للأصناف ذات الإثمار النهائي، يتم تقليمها على شكل الكأس أو المحور. بينما الأصناف ذات الإثمار الجانبي تتناسب مع تقليم المحور الحر أو المنظم.

مختلف أشكال تقليم التكوين :

#### ✓ التكوين على شكل كأس

هذا التقليم التقليدي يسمح توازن جيد الأغصان الرئيسية واستخدام جيد للفضاء في الحقل.

يبين الجدول التالي مراحل تقليم التكوين الكأسي.

جدول 3 : مراحل تقليم التكوين الكاسي

الشتاء الخامس: نهاية تقليم التكوين	الشتاء الرابع: اختيار الأغصان الثانوية و تقليمها	الشتاء الثالث: اختيار الأغصان الثانوية و تقليمها	الشتاء الثاني: اختيار 3 أغصان رئيسية و تقليمها	عند الغرس قطع الجذع عند ارتفاع 1.60 م، إزالة العيون لمساعدة الأغصان الرئيسية على النمو.

✓ تقليم المحور "الحر"

هذا الشكل صالح للأشجار التي تمت زراعتها في التربة ذات جودة عالية (عميقة، خصبة، مسقية) لان خطر انسداد الأشجار محدود.

يقترَب شكر هذا التقليم من هيكل شجرة الجوز غير المقلّة، و يهدف الى الحصول على محور ينمو ببيون تقليم خلال ظروف النمو العادية حيث يضمن توزع الإثمار على الأغصان الجانبية المتدرجة على طول الجذع .

يبين الجدول التالي مراحل تقليم المحور الحر.

جدول 4 : مراحل تقليم المحور الحر.

الشتاء الرابع: بدء إزالة الأغصان الجانبية الزائدة.	الشتاء الثالث: إزالة أطراف الأغصان الجانبية القوية.	الشتاء الثاني: قطع الأغصان المتنافسة مع الجذع.	عند الغرس إزالة العيون التي تتواجد في الجزء الأوسط للشجرة ذات السننتين






✓ تقليم المحور المنظم

عكس تقليم المحور الحر، يتم حمل الأغصان المثمرة على عدد أقل من الأغصان الجانبية، هذا التقليم مناسب للأصناف ذات الإثمار الجانبي.

يتم قطع المحور سنويا حتى الارتفاع النهائي، لتشجيع نمو الأغصان الجانبية قوية وذات توجيه جيدا..

يبين الجدول التالي مراحل تقليم المحور المنظم.

جدول 5 : مراحل تقليم المحور المنظم


				
الشتاء الخامس:	الشتاء الرابع:	الشتاء الثالث:	الشتاء الثاني:	في الغرس:
اختيار الأغصان الفرعية و الثانوية التي ستشكل الطابق الثالث	قطع الجذع اختيار الأغصان الفرعية و الثانوية التي ستشكل الطابق الثاني	قطع الجذع عند 1.50 متر فوق الأغصان المكونة للطابق الأول.	قطع الجذع على ارتفاع بين 1.80م و 2م	قطع الجذع فوق نقطة التطعيم مباشرة
		اختيار 2 إلى 4 الأغصان الرئيسية.		

4.2. تقليم الصيانة

إن تقليم الصيانة ضروري للحفاظ على انتاجية البستان. فإنه يعزز تغلغل الضوء في الشجرة ويضمن التوازن بين النمو الخضري و انتاج الثمار.

وفي حالة عدم القيام بهذه التقنية نلاحظ :

- أغصان قصيرة مع أوراق قليلة و انخفاض في حجم الجوز
- انخفاض وانعدام وصول الضوء داخل الشجرة يؤدي إلى موت الأغصان وسوء تغذية بعضها.

تقليم الصيانة	
عموماً تحتاج الشجرة إلى عمليات تقليم خفيفة حيث أنها بطبيعتها تبني تاجها بشكل متفرق ومتباعد الفروع بفضل تغطية مواضع القطع بالشمع وبعد ذلك لاتجري عملية تقصير الفروع وعند بدء الإثمار يقتصر التقليم على:	
- إزالة التشابك واستبدال بعض الفروع الرئيسية بأفضل منها إن لزم الأمر.	
- إزالة الأغصان القريبة (المتزاحمة)	
- إزالة الأغصان المريضة والمتضررة بالصقيع	
- إزالة الأغصان التي يتطفل حفار ساق التفاح والحشرات الأخرى.	

### 4.3. أدوات التقليم

لتقليم جيد للأشجار، يجدر استخدام الأدوات المناسبة و يجب ان تكون حادة و غير صدئة. بعد استخدام هذه الأدوات يجب مسح شفراتها بمنديل به زيت.

ومن بين الأدوات الأكثر استخداما أثناء التقليم، نذكر المقص والمقص والمنشار ومنشار القوة والسلام كما هو مبين أدناه.



صورة 3: أدوات التقليم

من أجل تفادي انتقال الأمراض



❖ لا بد من تحسين العمال بضرورة تعقيم المعدات (المقص ومقص القوة والفأس) خلال عملية التقليم لتفادي انتقال الأمراض من شجرة لأخرى.

### 5. السقي

يعتبر الري واحد من أهم العمليات التي تساهم في نجاح بستان الجوز حيث تساهم في رفع انتاجية أشجار الجوز.

تقدر الاحتياجات المائية لشجرة الجوز ب1270 ملم من الأمطار سنويا، و تحتاج أشجار الجوز إلى أكثر من 50% من إمدادات المياه السنوية خلال الصيف (يونيو ويوليو و غشت).

يؤدي الإجهاد المائي إلى تأثيرات مختلفة حسب فترة حدوثه :

- ❖ خلال الفترة التي تمتد بين نهاية شهر يونيو وبداية شهر يوليو، يؤثر حدوث الإجهاد المائي على الثمار حيث ينقلص حجمها و كذلك على النمو الخضري للأشجار.
- ❖ أما إذا حدث الإجهاد المائي خلال شهر يوليو فهو يؤثر على تكوين البراعم المثمرة لمحصول السنة القادم بشكل سيء.
- ❖ أما نقص المياه خلال الفترة الممتدة بين منتصف شهر يوليو ومنتصف شهر شتنبر، فإنه يؤدي إلى الحصول على جوز ذو جودة سيئة.

تعتبر الأصناف ذات الإثمار الجانبي أكثر حساسية للإجهاد المائي من الأصناف ذات الإثمار النهائي.

الاحتياطات الواجب اتخاذها من أجل نجاح عملية السقي



- ❖ يجب توجيه عناية خاصة لري أشجار الجوز في الوقت المناسب للحصول على ثمار ذات حجم كبيرة وجودة عالية،
- ❖ يختلف عدد الريات وكمياتها ومواعيدها باختلاف ظروف المناخ والتربة وعمر الأشجار، وعموماً يمكن سقي الأشجار خلال فترة النمو من 4 إلى 6 ريات،
- ❖ يعتبر ري الجوز بالتنقيط أفضل وسيلة لاقتصاد المياه و لنجاح عملية السقي.

## 6. التسميد

عند الغرس يجب امداد التربة بالعناصر الغذائية التالية:

- الفوسفور ( $P_2O_5$ ) : إمدادات كبيرة نسبياً ممكنة (تصل إلى 300 وحدة) في درجة الحموضة 5،6-7،5.
- البوتاسيوم: لا تتجاوز 300 وحدة ، أو حتى 200 وحدة في التربة ذات نفاذية عالية.

يبين الجدول التالي كميات الأسمدة التي يجب امداد أشجار الجوز المثمرة بها :

جدول 6 : كمية الأسمدة

العناصر					فترة الامداد
MgO المنغنيز يوم	CaO الكالسيوم	البوتاسيوم $K_2O$	الفوسفور $P_2O_5$	الأزوت N	
20 إلى 40	250	80 إلى 120	20 إلى 40		نهاية فصل الشتاء
				30 إلى 40	بداية ابريل
				30 إلى 40	منتصف ماي

الاحتياطات الواجب اتخاذها خلال عملية التسميد



- ❖ يجب اجراء تحليل التربة لمعرفة نسبة العناصر المعدنية وذلك من اجل تحديد كمية الأسمدة التي يجب امداد اشجار المشمش بها.
- ❖ يجب أن يترافق التحليل الورقي مع تحليل التربة خاصة من اجل تحديد نقص العناصر الصغرى.
- ❖ عقلنة استعمال الأسمدة من أجل الحفاظ على التربة.

## 7. صيانة التربة و محاربة الأعشاب الضارة

### 7.1. فئات الأعشاب الضارة

تنقسم انواع الأعشاب الضارة الى ثلاثة انواع السنوية والأعشاب التي تعيش سنتين والأعشاب المعمرة.

#### ➤ الأعشاب الضارة السنوية

هي التي تنبت وتزهر وتعطي البذور خلال السنة .

➤ الأعشاب الضارة التي تعيش سنتين

هذه النباتات لديها دورة لمدة عامين، أي أنها تنتج أوراق في السنة الأولى والزهور في السنة الثانية.

تتنافس الأعشاب السنوية والسنوية على المغذيات والمياه مع الأشجار التي تنمو حولها. بعد الإزهار، تموت هذه النباتات، ولكن بذورها يتم تخزينها في التربة، يمكن أن تستمر في الإضرار أشجار الجوز لعدة سنوات.

➤ الأعشاب الضارة المعمرة

هذه النباتات تعيش لسنوات عديدة، وعادة ما تنتشر في التربة من قبل نظام الجذور المختلف، ويمكن لبعضها ان تتكاثر عن طريق البذور. وعادة ما تزهر مرة واحدة في السنة و تنتشر في البستان، عن طريق تمتد جذورها وانتاج البذور التي تقع على الأرض. يمكن أن تتنافس النباتات المعمرة مع اشجار الجوز، خاصة إذا كانت مجتمعة بكثافة حول الاشجار.

7.2. محاربة الأعشاب الضارة

تتجلى صيانة الأرض في تنفيذ مجموعة من التقنيات التي تهدف إلى الحفاظ على التربة في حالة جيدة بعد الزراعة، من أجل تحسين عمل الجذور. يمكن أن نقوم بهذه العملية عن طريق اعداد التربة ميكانيكيا على الطبقة السطحية، أو عن طريق مكافحة الأعشاب كيميائيا، أو بتغطية الأرض بالأغطية البلاستيكية.. وتهدف كل هذه التقنيات إلى القضاء على الأعشاب الضارة والحد من نسبة تبخر المياه.

في بساتين الجوز، تستعمل مبيدات الأعشاب للسيطرة على الأعشاب الضارة. يعتبر حش الاعشاب يدويا او ميكانيكيا من اهم الطرق الفعالة أخرى للقضاء على الأعشاب الضارة، وخاصة خلال السنة التي تمت بها عملية غرس الأشجار.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض المزارعين يقومون بحش العشب من اجل تغذية مواشيهم.

تساعد مبيدات الأعشاب المسجلة على التخلص من الأعشاب الضارة وينصح باستعمال مبيدات الأعشاب التي توجد في دليل وقايات النباتات المعتمد من طرف مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، و بالنسبة للمبيدات التي تستعمل في بساتين الجوز نجد المبيدات التي تحتوي على المادة النشطة أميتروول (240 غرام / لتر) والأمونيوم ثيوسيانات (215 غرام / لتر).

يجب احترام تعليمات استخدام مبيد الأعشاب و الكميات الموصى بها. كما يجب تناوب العناصر النشطة لمحاربة أكثر عدد ممكن من الأنواع.



8. التفقيح

يوجد على شجرة جوز الأزهار الذكرية والأنثوية على حد سواء.



الزهرة الأنثوية



الزهرة الذكرية

صورة 4 : الزهرة الذكرية و الزهرة الأنثوية شجرة الجوز

يوجد على كل شجرة جوز الأزهار الذكورية والأنثوية (الصورة أعلاه) على حد سواء. يتم نقل حبوب اللقاح بواسطة الرياح من الزهور الذكورية إلى الزهور الأنثوية.

تعتبر شجرة الجوز ذات خصوبة ذاتية، وهذا يعني أن حبوب اللقاح يمكن أن تسافر من الزهور الذكورية إلى الزهور الأنثوية لنفس الشجرة وبموجب هذا الإجراء يمكن أن تنتج الشجرة ثمار الجوز دون الحاجة إلى أشجار الجوز الأخرى حولها.

إلا أن عملية التلقيح الذاتي لا تتم إلا خلال فترة قصيرة بالنسبة لجميع أصناف الجوز ويرجع ذلك إلى:

- قصر فترة عيش حبوب اللقاح؛
- قصر مدة استقبال الميسم لحبوب اللقاح؛
- تفاوت كبير بين مواعيد الإزهار الكامل لدى الزهور الذكورية ولدى الزهور الأنثوية لنفس الصنف.

ويتميز عدد كبير من أصناف الجوز بهذا الانقسام، حيث يصطلح على هذه الأصناف أنها **مبكرة الذكورة**.

ونتيجة لذلك، فإن أفضل طريقة لضمان تلقيح كاف من أجل تحقيق أعلى عائد ممكن من الثمار هي زراعة أشجار جوز ملقحة إلى جانب الصنف الرئيسي المزروع.

ينصح بزراعة صنفين ملقحين أو أكثر حيث يمكن زراعة صنف من الجوز الذي ينتج حبوب اللقاح في وقت مبكر، جنباً إلى جنب مع صنف آخر ينتج حبوب اللقاح في وقت لاحق. الشيء الذي سوف يضمن توافر حبوب اللقاح الكافية تسافر مع الرياح إلى الزهور الإناث لتغطية فترة الإزهار بأكملها.

❖ يجب زرع 6 إلى 8 شجرة ملقحة بالهكتار الواحدة ( لتفادي وجود حبوب اللقاح أكثر من المطلوب، الشيء الذي يمكن أن يؤثر سلباً على تكوين الجوزات حيث سيزداد عدد الجوزات في المقابل سوف ينخفض حجمها ).  
❖ يمكن اختيار صنفين ملقحين مختلفين وغرسهما لضمان توفر حبوب اللقاح خلال فترة التلقيح.



## 9. امراض شجرة الجوز

### ❖ الأنتانوز

ينتج هذا المرض عن الإصابة بالفطر أسكوميسيت غنومونيا ليبنوستيلا.

أهم أعراض المرض هي:

- ظهور تقرحات على الثمار والأوراق الصغيرة في حالات الإصابة الشديدة المرض يؤدي الى سقوط الثمار.



صورة 5 : اعراض مرض الأنتاكنوز على أوراق وثمار شجرة الجوز

#### المكافحة الوقائية :

- عند غرس البستان، من المستحسن تجنب المناطق الضعيفة التهوية، التي تؤدي إلى تطور المرض.
- من المستحسن تجنب الإفراط في كمية الاسمدة الأزوتية.
- عندما أصابة الأشجار، يجب إزالة الأغصان المصابة وحرقتها.
- القضاء على البراعم المصابة خلال عملية التخفيف يساعد على السيطرة على المرض

#### المكافحة الكيميائية:

استعمال مبيد فطري يحتوي على المادة النشطة ديثيانون.

#### ❖ مرض اللفحة:

تتسبب البكتيريا زانثوموناس أربوريكولا باثوفار جوغلانديس في ظهور هذا المرض.

أهم أعراض المرض هي:

- البكتريا تسبب تبقع صغيرة سواء على الأوراق حديثة التكوين مما ينتج عنه منطقة جلدية كبيرة على سطح الأوراق.
- في حالات الإصابة الشديدة يحدث جفاف على مستوى الأغصان وتصبح الثمار صغيرة الحجم.
- فقدان كمية كبيرة من المحصول خاصة في حالة إصابة النورات الذكورة.
- الإصابة تصبح شديدة تحت ظروف الجو الرطب والبرودة أثناء الإزهار.





صورة 6 : اعراض مرض اللفحة على أوراق وثمار شجرة الجوز

#### المكافحة الوقائية :

- ✓ الحفاظ على مسافة الغرس الكافية بين الأشجار
- ✓ التقليم المنتظم من أجل تهوية جيدة للأشجار.
- ✓ قطع وحرق الأغصان المصابة
- ✓ اختيار أصناف أقل حساسية أو ذات إزهار متأخر.
- ✓ تجنب حدوث أي إصابة بالأشجار
- ✓ تجنب امداد ورقي يحتوي على الأزوت.
- ✓ اعتماد ري وتسميد متوازن

#### المكافحة الكيميائية:

لا يوجد أي مبيد يستعمل للقضاء على هذا المرض.

في حالة بداية ظهور المرض ينصح باستعمال المبيدات الوقائية التي تحتوي على النحاس.

#### الاحتياطات الواجب اتخاذها خلال مكافحة الأمراض والحشرات




- ❖ اجراء المراقبة الحقلية للحد من انتشار الأمراض والحشرات.
- ❖ تبني اسس مكافحة البيولوجية ضد الأمراض والحشرات.
- ❖ عقلنة استعمال المواد الكيميائية (احترام الكمية المسموحة).

10. حشرات شجرة الجوز

جدول 7: أهم الحشرات التي تهاجم شجرة الجوز

الصورة	العلاج	الأعراض	الحشرة
	في نهاية فصل الشتاء استعمال الزيوت الأبيض للسيطرة على القرديات في حالة انتشار القرديات استعمال مبيد ضد القرديات في أواخر الربيع .	تهاجم عدة أنواع من القرديات أشجار الجوز من بينها : القرديات الحمراء، وتتجلى أعراض الإصابة بهذه الحشرات في: تحول لون الأوراق الى فضي ثم برونزي وتساقطها مبكرا، ضعف في نمو الشجرة وضعف في الإنتاج، ثمار صغيرة الحجم. بيوض حمراء على البراعم والأغصان في الشتاء	القرديات
	يمكن مكافحة المن بواسطة المفترسات و الطفيليات الطبيعية كالخنافس. يمكن للمبيدات المستعملة ضد حشرة البسيل في بداية الموسم الحد من حشرات المن. عند مكافحة الكيمائية يجب مراقبة البراعم الصغيرة لمعرفة وجود المن و عددها، و يجب القيام بالمكافحة في يونيو يوليو و احترام الكميات الموصى بها حتى لا يتم القضاء على الاعداء الطبيعية .	هناك أنواع كثيرة من حشرات المن تهاجم شجرة الجوز . من العروق يشكل مستعمرات على طول العروق للجهة العلوية للأوراق، اما المن الأصفر فيهاجم الجانب السفلي من الأوراق.	المن
 	فترات المعالجة يجب أن تكون الحماية دائمة خلال فترة الخطورة باستعمال المصائد الفيرومونية. يجب أن تتجاوز فترة العتبة (3 فراشات / اليوم). • نوعية مكافحة ضد الجيل الأول حاسمة لمكافحة الكاربوكابس. يمكن أن تتضاعف الخسائر بعشر مرات بين ج1 و ج2. • في حالة إذ ما تم التحكم في الجيلين الأول و الثاني يكون الجيل الثالث أقل ضررا. لكن يجب أن تكون مراقبة البساتين دائمة ( البحث عن الثقوب على الثمار ) والإستمرار في مراقبة الحشرات باستعمال المصائد الفيرومونية إلى غاية الجني. السيطرة الكيميائية إستراتيجية مكافحة : تركز مكافحة الكيميائية على بيولوجية الكاربوكابس و معطيات الرصد الجوي لتوقع فترات الطيران و مرحلة النمو النباتي للأشجار ( مرحلة قابلية التأثر ). يجب أن يكون لدى الفلاح مقياس إرتفاع و إنخفاض درجة الحرارة. وضع مصيدة / هك إطلاقا من 10 أفريل و القيام بإحصاء و تسجيل عدد الحشرات التي تم القبض عليها يوميا.	يهاجم الكاربوكابس شجرة الجوز و يؤدي حجم الأضرار إلى خسائر كبيرة في المحاصيل. تدخل البيرقات الى داخل الثمار مما يتسبب في سقوطها قبل النضج. في حالة المهاجمة المتأخر لا تسقط الثمار لكنها تكون غير صالحة للاستهلاك	الكاربوكابس

إعداد المراجع التقنية والتقنية الاقتصادية

الصورة	العلاج	الأعراض	الحشرة
	<p>معالجة مضادة للبيوض: بدء المعالجة الأولى عند القبض على 3 فراشات/ المصيدة/ اليوم عند وصول درجات حرارة الشفق (طلوع وغروب الشمس ) 18°م على مدار يومين، القيام بمعالجة مضادة للبيوض</p> <p>معالجة مضادة لليرقات</p> <p>عند القبض على 3 فراشات / المصيد/ اليوم، وصول درجة الحرارة إلى 90°م على أساس 10 بعد وضع البيوض ( مجموع درجات الحرارة المعتدلة و اليومية - 10°م ) = 90°م مما يعادل فترة التحضين: معالجة مضادة لليرقات .</p> <p>✓ في حالة التأخر في وضع المصائد، يجب القيام أولاً بمعالجة مضادة لليرقات للتخلص من اليرقات المتواجدة و إعادة المعالجة 3 أيام بعد اتباع الإستراتيجية المذكورة أعلاه باستعمال مبيدات مضادة للبيوض و اليرقات</p>		

## 11. الجني والتحويل والتخزين

### 11.1. الجني

تتم عملية الجني عند بداية تفتح القشرة الطرية الخارجية لحبات الجوز وبدء ظهور قشرتها الصلبة، تمتد فترة نضج الجوز بين نهاية شهر شنتير و نهاية شهر أكتوبر. من أجل تسهيل انفصال القشرة الخارجية عن حبات الجوز، يمكن سقي الشجرة حتى موسم الجني.



صورة 7 : علامات نضج ثمار الجوز (تفتح القشرة الطرية الخارجية)

يتم عملية الجني بطريقة تقليدية بتقنية ضرب العصى أو بالطرق العصرية من خلال استعمال آلات الارتجاجية . وبعد نهاية الجني يتم إزالة القشرة الخارجية لحبات الجوز ونشر الثمار لتجف.

### 11.2. الانتاج

يختلف المحصول من الجوز حسب عمر الشجرة. في حالة البساتين التي بها أشجار لا يتجاوز عمرها عن 10 سنوات، فإن الإنتاج لا يتجاوز 0.8 طن (10 إلى 15 كجم / شجرة)، أما في بستان الذي به أشجار عمرها يتراوح بين 10 و 20 سنة، ويتراوح المحصول بين 1.2 و 1.5 طن (20-25 كجم / شجرة)، أما بالنسبة لأشجار التي تفوق 20 سنة، يمكن أن يتجاوز المحصول في بعض الأحيان 2 طن / هكتار أو حوالي 40 كجم لكل شجرة. وتختلف مستويات الإنتاج من سنة لأخرى.

### 11.3. تكسير الجوز و إزالة القشرة

يستخدم مزارعو الجوز تقنيات تقليدية للتخزين. فبعد تجفيف الجوز، يتم وضعها في أكياس بدون أي علاج مسبق. بهذه الطريقة، يمكن للمنتج تخزين الجوز لمدة تصل إلى 7 أشهر. في المناطق المتجانسة، تتم عملية تكسير الجوز يدويا وتتعلق هذه العملية بالجوز الذي سيتم استهلاكه من قبل الفلاح و ليست للبيع حيث يبيع الفلاحون الجوز بقشرته في الأسواق الأسبوعية..

بالنسبة للجوز ذي القشرة يمكن أن يتم تخزينه لمدة 7 إلى 8 أشهر في درجة حرارة العادية والرطوبة النسبية أقل من 70%.

### 11.4. التسويق

تضم سلسلة تسويق الجوز الفاعلين الاساسيين: الجامعون والوسطاء وتجار الجملة.

#### ✓ الجامعون

الذين يقومون بتجميع اكير كمية من الجوز حيث يشترونه من الفلاحين. و أغلب الجامعون هم من سكان مناطق الإنتاج تربطهم علاقات بالفلاحين (القرابة او الصداقة) مما يساعدهم على الشراء.

✓ الوسطاء

على عكس الجامعين، الوسطاء لا يستخدمون مالهم الخاص والتسويق المعدات الخاصة بهم. يتم توفير الخلفية الضرورية والمعدات من قبل وكيل (جامع أو تاجر الجملة) الذين هم على اتصال به. ويحصلون على عمولة تتناسب مع كمية الجوز التي يتم جمعها. هم يعرفون مناطق الإنتاج العالية وتحكمون في تغير الأسعار خلال كل مرحلة من مراحل الحملة.

✓ تجار الجملة

وعادة ما يقوم هؤلاء التجار بتخزين كميات كبيرة من الجوز من خلال الجامعين أو الذين لديهم وسطاء.

يقومون ببيع الجوز الذين اشتروه من عدد الجامعين أو تجار الجملة في المدن الكبرى. و في بعض الأحيان يكون تاجر الجملة هو نفسه الجامع و الوسيط إذا كان يمتلك رأس الما الكافي للقيام بذلك.



المكتب الوطني للإستشارة الفلاحية  
Office National du Conseil Agricole

**Siège : Avenue Mohamed Belarbi Alaoui – Rabat**  
**Adresse postale : B.P : 6672 – Rabat Instituts**  
**Tél : 0537.77.65.13**  
**Fax : 0537.77.92.89**  
[www.onca.gov.ma/](http://www.onca.gov.ma/)

**NOVEC**  
GROUPE CDG

**Immeuble NOVEC, Park Technopolis 11 100, Sala El Jadida/ Rabat-Salé**  
**Tél : 0537 576 800**  
**Fax : 0537 566 741**  
**www.novec.ma**