

Marché N° 31/2015/ONCA

ELABORATION DES REFERENTIELS TECHNIQUES ET TECHNICO-ECONOMIQUES

PHASE 3 : ELABORATION DES REFERENTIELS TECHNIQUES ET TECHNICO- ECONOMIQUES SPECIFIQUE A LA FILIERE

CAS DE LA FILIERE DES CULTURES MARAICHERES



CAS DE LA REGION TANGER TETOUAN ALHOCEIMA

Version définitive

TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES	2
LISTE DES TABLEAUX	4
PREAMBULE	5
1. IMPORTANCE ECONOMIQUE DES CULTURES MARAICHERES	6
2. CULTURE DE LA POMME DE TERRE	6
2.1. LES EXIGENCES AGRO ECOLOGIQUES.....	6
2.2. SEMENCES.....	6
2.3. SEMIS.....	7
2.3.1. Préparation des plants	7
2.3.2. Densité de semis.....	7
2.3.3. Profondeur de semis	8
2.4. TRAVAIL DU SOL	8
2.5. FERTILISATION	9
2.6. IRRIGATION	9
2.7. OPERATION D'ENTRETIEN.....	10
2.7.1. Buttage	10
2.7.2. Binage	11
2.8. MALADIES ET RAVAGEURS DE LA POMME DE TERRE	11
2.9. CONTROLE DES MAUVAISES HERBES.....	19
2.9.1. Herbicides.....	19
2.9.2. Binages et buttages.....	19
2.10. RECOLTE.....	19
2.10.1. Défanage.....	19
2.10.2. Maturité	20
2.10.3. Récolte	20
3. CULTURE D'OIGNON	21
3.1. LES EXIGENCES AGRO ECOLOGIQUES.....	21
3.2. VARIETES.....	21
3.3. SEMIS.....	21
3.4. TRAVAIL DU SOL	22
3.5. FERTILISATION	22
3.6. IRRIGATION	23
3.7. DESHERBAGE.....	23
3.8. MALADIES ET RAVAGEURS DE L'OIGNON.....	24
3.9. RECOLTE	29
3.10. SECHAGE	29
3.10.1. Pré-séchage au champ.....	29
3.10.2. Séchage	29
4. RENTABILITE ECONOMIQUE.....	31
4.1. METHODE DE CALCUL DE LA RENTABILITE D'UN HECTARE DES CULTURES MARAICHERES.....	31

Elaboration des référentiels techniques et technico-économiques

4.1.1. Les charges de production	31
4.1.2. Les recettes des exploitations	31
4.1.3. La marge brute et la valeur ajoutée	31
4.2. FICHE TECHNICO ECONOMIQUE DE LA POMME DE TERRE PAR ZONE HOMOGENE POUR LA REGION DE TANGER TETOUAN AL-HOCEIMA	32
4.3. FICHE TECHNICO ECONOMIQUE DE L'OIGNON PAR ZONE HOMOGENE POUR LA REGION DE TANGER TETOUAN AL HOCEIMA	37
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES RELATIVES A LA CULTURE DE LA POMME DE TERRE.....	40
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES RELATIVES A LA CULTURE DE L'OIGNON	41

LISTE DES TABLEAUX

TABLEAU 1 : LES PRINCIPALES VARIETES UTILISEES PAR LES AGRICULTEURS DANS LA REGION DE TANGER TETOUAN AL HOCEIMA	7
TABLEAU 2 : DOSE DE SEMIS PAR REGION ET PAR ZONE HOMOGENE	8
TABLEAU 3 : SEMIS DE LA POMME DE TERRE PAR REGION ET PAR ZONE HOMOGENE	8
TABLEAU 4 : TRAVAIL DU SOL DANS LA REGION DE L'ORIENTAL.....	9
TABLEAU 5: PROGRAMME DE FERTIGATION DE LA POMME DE TERRE.....	10
TABLEAU 6 : VARIETE PAR REGION ET PAR ZONE HOMOGENE	21
TABLEAU 7 : PERIODE DE SEMIS DE L'OIGNON SELON LES ZONES HOMOGENES	22
TABLEAU 8 : TRAVAIL DU SOL PAR ZONE HOMOGENE	22
TABLEAU 9 : PROGRAMME DE FERTIGATION DE L'OIGNON (KG/HA).....	23
TABLEAU 10 : METHODES DE DESHERBAGE	24
TABLEAU 11: METHODE DE CALCUL DE LA MARGE BENEFICIAIRE D'UN HECTARE DE CULTURES MARAICHERES (POMME DE TERRE, OIGNON ET TOMATE)	32

PREAMBULE

L'Office National du Conseil Agricole a confié à NOVEC, le Marché N° 31/2015/ONCA pour l'établissement de l'étude relative à l'élaboration des référentiels techniques et technico-économiques.

Selon les Termes De Références (TDR), les prestations à réaliser dans le cadre de la présente proposition se présentent comme suit :

- **Phase 1** : Elaboration de la note méthodologique
- **Phase 2** : Caractérisation des principales filières
- **Phase 3** : Elaboration d'un référentiel technique et technico-économique spécifique à la filière
- **Phase 4** : Voies d'amélioration et mesures d'accompagnement

Le présent dossier est relatif à la phase 3 : **Elaboration d'une fiche technique des cultures maraichères pour la région de Tanger Tétouan Al Hoceima.**

1. Importance économique des cultures maraîchères

Les cultures maraichères (oignon, tomate et pomme de terre) occupent 116 240 ha en moyenne, soit 44% des superficies dédiées au maraichage au pays. La pomme de terre occupe une grande superficie suivie de l'oignon et la tomate en troisième rang.

La production des oignons réalisée au titre de la campagne 2014/2015 est évaluée à près de 886209 t de bulbes (DSS), soit une hausse de 2% par rapport à 2013/2014 et une baisse de 5% par rapport à 2012/2013.

La production des tomates a enregistré une nette augmentation passant de 1 219 072 t en 2011/12 à 1 412 380 t en 2014/15.

En 2015/14, la production des pommes a enregistré aussi une progression de 16 % par rapport à 2011/12, et elle a atteint 1 924 430t.

2. Culture de la pomme de terre

2.1. Les exigences agro écologiques

La pomme de terre est très sensible au gel, le zéro de végétation est compris entre 6 et 8°C. Les températures optimales de croissance des tubercules se situent aux alentours de 18°C le jour et 12°C la nuit. Les températures du sol supérieures à 25°C sont défavorables à la tubérisation.

La croissance végétative de la pomme de terre est favorisée par la longueur du jour élevée (14 à 18h). Une photopériode à 12h favorise la tubérisation. L'effet du jour long peut être atténué par les basses températures.

La plupart des sols convient à la culture de la pomme de terre à condition qu'ils soient bien drainés et pas trop pierreux. Les sols préférés sont ceux qui sont profonds, fertiles et meubles.

La pomme de terre se développe mieux dans un sol légèrement acide (pH=5.5 à 6). En sols à pH basique, qui sont d'ailleurs, les plus rencontrés au Maroc, certaines micro-éléments demeurent indisponibles pour la plante notamment le fer, le manganèse, le zinc et le cuivre. Cependant, une alcalinité excessive du sol peut causer le développement de la galle commune sur tubercule.

La pomme de terre est relativement tolérante à la salinité par rapport aux autres cultures maraichères. Cependant un taux de salinité élevé peut bloquer l'absorption de l'eau par le système racinaire. Lorsque la teneur en sel est élevée, le point de flétrissement est atteint rapidement. On peut réduire la salinité d'un sol en le lessivant avec une eau d'irrigation douce.

2.2. Semences

On classe les variétés selon leur type de culture: culture de primeurs ou culture de saison et arrière saison.

Ainsi les principales variétés utilisées dans la région de l'oriental sont mentionnées dans le tableau suivant :

Tableau 1 : les principales variétés utilisées par les agriculteurs dans la région de Tanger Tétouan Al Hoceima

Région	Zone homogène	Variétés utilisées
Tanger Tétouan Al-Hoceima	Zone rifaine	Les agriculteurs utilisent la variété « Désirée » qu'ils nomment « Btata Hamra ». Plusieurs variétés sont utilisées dont : Nicola, Désirée, Spunta, Diamant.
	zone de plaine de loukkous	Plusieurs variétés sont utilisées dont : Cornado, Mondial, Manito, Liseta.....

(Diagnostic participatif, 2017)



Le choix des semences est nécessaire pour assurer une grande rentabilité et une productivité

- ❖ Il est conseillé de :
 - ✓ utiliser autant que possible les semences sélectionnées et certifiées car la plupart des maladies virales peuvent s'étendre avec l'utilisation de plants produits sur l'exploitation ;
 - ✓ Utiliser des tubercules de 50-60g ;
 - ✓ éviter les trop petits tubercules qui risquent de provenir de plantes dégénérées.
- ❖ Il est déconseillé de :
 - ✓ sectionner les gros tubercules dans un but d'économie des charges élevées des semences puisque le sectionnement des tubercules risque d'être un moyen de transmission de maladies
 - ✓ utiliser des tubercules ayant été stockés à 0°C car les yeux se détériorent à cette température.

2.3. Semis

2.3.1. Préparation des plants

La plantation de la pomme de terre ne peut avoir lieu qu'après la levée totale de la dormance. L'utilisation des plants non pré germés est suivie par un retard de l'émergence, donnent des plantes mono tiges et par la suite un rendement faible.

La préparation des plantes doit conduire à une émergence uniforme et rapide, à des plantes poly tiges et enfin à un rendement élevé.

Pour assurer une bonne préparation des plants, il est nécessaire de procéder au retrait du frigo 2 à 3 semaines avant la plantation. En cas où la germination a déjà démarré, il faut éliminer le germe apicale afin d'accélérer les germes latéraux. Après la sortie du frigo les plants doivent être déposés dans un local bien aéré et éclairé ; cela a pour avantage d'obtenir des germes trapus, lignifiés, facile à manipuler au cours de la plantation.

2.3.2. Densité de semis

La densité d'une culture de pomme de terre n'est autre que le nombre de tiges/m². Pour une bonne occupation du sol, 15-20 tiges /m² paraît optimal. Un plant de calibre 35-55 mm pré-germé produit approximativement 5 à 6 tiges principales. Généralement, on place 4 plants/m². Avec une distance de 70 cm entre lignes et 30 cm entre plants, on a besoin de 2000 à 2500 kg de semences par hectare.

Tableau 2 : dose de semis par région et par zone homogène

Région	Zone homogène	Dose de semis
Tanger Tétouan Al- Hoceima	Zone rifaine	La quantité utilisée est de l'ordre de 4 T/hectare.
	zone de plaine de loukkous	La quantité utilisée est de 2.5 tonnes à 3 tonnes par hectare pour la semence importée et elle peut atteindre 4 tonnes pour la semence réutilisée en arrière saison.

(Diagnostic participatif, 2017)

2.3.3. Profondeur de semis

Pour obtenir une culture homogène, les tubercules doivent être plantés à une profondeur uniforme. La profondeur de plantation dépend du type de sol, des conditions climatiques et de l'âge physiologique des plants. La plantation superficielle (5 à 6 cm) est préférée dans un sol lourd et humide, où les tubercules mères risquent de s'épuiser avant que les germes puissent atteindre la surface du sol. Inversement, pour les sols à texture légère où les risques de dessèchement sont à craindre, une plantation profonde est conseillée (10 cm environ).

Les plants physiologiquement vieux sont relativement faibles et s'épuisent rapidement. Il est préférable de les planter superficiellement dans un sol humide.

Tableau 3 : Semis de la pomme de terre par région et par zone homogène

Région	Zone homogène	Semis de la pomme de terre
Tanger Tétouan Al- Hoceima	Zone rifaine	L'installation est précédée par un ameublissement et un aplanissement de sol par l'araire ou un cover-crop (dit Grada, localement). C'est l'araire qui est l'outil de préparation du sol le fréquent. Les écartements de plantations sont : 0,75 à 1 m entre les lignes et 0,5 m entre les plants. Les agriculteurs procèdent à la confection de trous sur les lignes de plantation. C'est des trous 30 cm de diamètre et 20 cm de profondeur environ. Les agriculteurs mélangent de la terre et un peu de fumier ou des engrais minéraux (dits localement Abounou) et placent les pommes de terre dans ce mélange, puis procèdent à leur couverture. Les agriculteurs procèdent à la division en deux des tubercules gros. Ces derniers sont mélangés à de la cendre avant la plantation. Cette technique éviterait à ces tubercules de moisir. La plantation se fait par la main d'œuvre locale.
	zone de plaine de loukkous	Le semis est précédé par l'opération de traçage. La confection des billons de plantation est très rare, en effet elle n'est pratiquée qu'au niveau des sols argileux à faible pouvoir drainant. Les distances de semis communément observées sont de 70 cm entre les lignes et 15 à 20 cm entre les plants. Le semis se fait à la main par la main d'œuvre locale.

(Diagnostic participatif, 2017)

2.4. Travail du sol

Le sol doit être préparé sur une profondeur d'au moins 25-30 cm. Une telle couche meuble favorise l'aération du sol, assure un bon développement racinaire et facilite le buttage.

La réalisation d'un bon lit de semis peut se faire de la façon suivante:

- Labour moyen: 25 à 30 cm avec charrue.

Elaboration des référentiels techniques et technico-économiques

- Epandage de la fumure organique et des engrais phospho-potassiques que l'on enfouie à l'aide d'un cover-crop croisé.
- Confection des lignes ou billonnage: Ces travaux sont beaucoup plus faciles à réaliser dans un sol léger que dans un sol lourd. Dans un sol lourd les travaux du sol doivent se limiter à la couche supérieure suffisamment ressuyée. Une bonne préparation des dix premiers cm permet une bonne couverture du plant.

Tableau 4 : travail du sol dans la région de l'oriental

Région	Zone homogène	Travail du sol
Tanger Tétouan Al- Hoceïma	Zone rifaine	En bour, aucune préparation de sol préalable n'est faite par les agriculteurs. C'est au moment de l'installation que les travaux du sol sont réalisés. Au mois de janvier, il est procédé à un labour de préparation du sol, soit à l'aide de la traction animale (majorité des cas), soit par une charrue à disque pour les agriculteurs relativement aisés. Ces labours sont accompagnés d'un épandage de fumier de ferme estimé à 10 T/ha. Pour les agriculteurs qui ne disposent pas de suffisamment de fumier, ces apports sont apportés au moment de la plantation avec localisation autour du tubercule planté.
	zone de plaine de loukkous	La plantation de la pomme de terre est précédée par la réalisation d'un labour profond et l'épandage du fumier au mois de novembre, suivi d'un cover-crop en décembre avec enfouissement du fumier. Ces opérations sont réalisées par les agriculteurs eux-mêmes.

(Diagnostic participatif, 2017)

2.5. Fertilisation

Les doses de fertilisation à apporter sont comme suit :

- Fumure de fond

Azote: 20 à 30 unités/ha soit 100 à 150 kg de sulfate d'ammoniaque à 21%.

P205: 150 unités/ha soit 850 kg de superphosphate à 18%

K20: 180 à 200 unités/ha soit 375 à 400 kg de sulfate de potasse à 48%.

- Fumure de couverture

Azote: 100 unités/ha soit 300 kg d'ammonitrate à 33.5% fractionnés en trois périodes: Levée, 1er buttage et 2ème buttage.

2.6. Irrigation

✓ Dose d'irrigation

Les besoins hydriques de pomme de terre s'évaluent entre 400 et 600 mm selon les conditions climatiques, le type de sol et la longueur du cycle.

✓ Fréquence d'irrigation

Au cours de la germination, la quantité d'eau nécessaire est faible. Le tubercule mère doit être entouré du sol humide, mais pas mouillé. De ce stade jusqu'à la formation des tubercules (60 à 90 jours) après plantation, l'irrigation doit être faite à un intervalle très court, 6 à 7 jours en sol léger et 12 à 15 jours en sol lourd. Pour tous les types de culture (primeurs ou saison) on arrête l'irrigation 10 à 20 jours avant la récolte.

Elaboration des référentiels techniques et technico-économiques

La culture préfère un régime continu d'apport d'eau (80 à 100 % de l'évapotranspiration maximale). Dans le cas d'une sécheresse imposée, il est recommandé de faire au moins trois irrigations d'appoint, à la mi-croissance (40 Jours Après Plantation), à la tubérisation (55-60 JAP) et au début grossissement des tubercules (75-80 JAP). Il est souhaité de porter régulièrement le sol à sa capacité au champ.

✓ Programme de fertigation :

D'après les résultats de recherche et les expérimentations effectuées dans différentes zones de production, le programme de fertigation adopté pour une culture de pomme de terre est le suivant :

Tableau 5: programme de fertigation de la pomme de terre

Stade	après la levée	développement végétative	tubérisation	grossissement des tubercules
période	à partir de la 1 ^{ère} semaine	De la 1 ^{ère} à la 8 ^{ème} semaine après la levée	De la 9 ^{ème} à la 12 ^{ème} semaine après la levée	De la 13 ^{ème} à la 15 ^{ème} semaine après la levée
Quantité d'engrais à apporter	<ul style="list-style-type: none">Démarrer la fertigationAppliquer les équilibres des éléments suivants : N : P2O : K2O.	3 :1 :2	2 :1 :2	1 :1 :3

- Les apports d'eau et des éléments fertilisants doivent être quotidiens tout en tenant compte des besoins de la plante selon le stade végétatif, le type du sol et les conditions climatiques ;
- Arrêter la fertigation 10 à 20 jours avant la récolte ;
- Ajuster le pH de la solution fille à 6 ou 6.5 avec une salinité maximale de 2.5 g/l.

2.7. Opération d'entretien

2.7.1. Buttage

Le buttage est défini comme étant l'opération qui consiste à ramener la terre, préalablement ameublie vers le billon pour former la butte. Cette opération consiste à:

- Couvrir les racines superficielles de la plante
- Couvrir les tubercules nouvellement formés qui verdissent en contact de la lumière
- Couvrir les engrais azotés et potassiques appliqués au cours de la culture.
- Prévenir la culture de la teigne.

Le 1er buttage doit se faire 2 à 3 semaines après levée. Les plants doivent être buttés de façon à être couverts au moins 10 cm de terre. Puis l'opération se répète chaque 2 à 3 semaine.

Le buttage est important car il empêche le verdissement des tubercules et les protège contre le mildiou et la teigne. Ils conseillent de faire 2 buttages et ces derniers peuvent être effectués au stade mi croissance et deux semaines plus tard.



2.7.2. Binage

Pour une bonne production, la pomme de terre demande une terre propre. L'opération consiste à prélever toutes les mauvaises herbes poussant entre les lignes avec la charrue et la sape entre les plants.




Le 1er binage se fait 2 à 3 semaines après la levée, puis il est répété chaque fois qu'on irrigue. Il faut veiller à ne pas toucher le système racinaire et les tubercules nouvellement formés.

Il est conseillé de faire 2-3 binages lors de la période végétative (jamais en période de tubérisation).



2.8. Maladies et ravageurs de la pomme de terre

Maladies	Symptômes	Méthode de lutte	Photo
Maladies fongiques			
Mildiou : <i>Phytophthora infestans</i>	<p>Sur feuilles :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sur la face supérieure : petites taches décolorées qui brunissent et sont entourées d'un halo jaune. - Sur la face inférieure : apparition de feutrage blanc caractéristique sur le pourtour des taches. <p>Sur tiges et bouquets terminaux :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apparition par temps humide de taches brunes, parfois nécrotiques. <p>Sur tubercules :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Extérieurement : taches aux contours mal défini, de couleur brune ou gris bleuâtre. - Sur coupe de tubercule : zone marbrées de couleur rouille en surface qui peuvent s'étendre vers le centre du tubercule. 	<p>Lutte chimique :</p> <p>Utilisation des fongicides : soit les fongicides de contact (agissent essentiellement sur la sporulation et la germination des spores.) ; les fongicides pénétrants (ils sont donc utilisés de façon préventive, en association avec des fongicides de contact.), les fongicides systémiques (Ils sont à la fois curatifs et préventifs). On signale que les agriculteurs doivent utiliser les produits homologués par l'ONSSA. Pour la lutte contre le mildiou, il existe 171 produits inscrits dans l'index phytosanitaire de l'ONSSA.</p> <p>Lutte biologique :</p> <p>consiste à contrôler les germes de mildiou au moyen d'agents de lutte biologique (ou antagonistes) tels que : <i>Streptomyces melanosporofacins</i> EF-76 ou <i>Streptomyces saraceticus</i> et Bactéries comme Bacillus, Pseudomonas, Rahnella et Serratia.</p> <p>Stratégie de lutte :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utiliser les semences saines, - Eliminer les tas de déchets de pomme de terre issus de la récolte précédente pour réduire la quantité d'inoculum primaire ; - Traiter chimiquement : la lutte chimique reste la méthode de lutte la plus efficace contre le mildiou. - Utiliser les systèmes de prévisions des risques du mildiou 	
Alternariose : <i>Alternaria solani</i> <i>Alternaria alternata</i>	<p>Sur feuilles : Taches nécrotique bien délimitées, situées plutôt sur les feuilles du bas ; présence d'anneaux concentriques sur les taches importantes.</p> <p>Sur tubercules : Pourritures brunes à noires, très sèches, assez typiques, avec une dépression.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eviter les stress nutritionnels provoquant une sénescence accélérée ; - Utiliser des traitements anti-mildiou efficaces sur Alternaria. 	




Elaboration des référentiels techniques et technico-économiques

<p>Rhizoctone brun <i>Rhizoctonia solani</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Apparition de nécroses sèches sur la partie souterraine des tiges ou des stolons ; - Observation de mycélium blanc visible au collet des tiges ; - Présence de petits sclérotés (corpuscules durs) de dimension et forme très variables, plates ou rugueuses, noir mat, fortement adhérents à la peau mais à l'ongle ; - Apparition de petites taches brunâtres arrondies, bien délimitées (2-4 mm), formant un bouchon liégeux (dry core) et peuvent être observé sur des tubercules. 	<ul style="list-style-type: none"> - Eliminer les débris de végétaux (sources d'inoculum primaire) ; - Prévenir les attaques au plus tard à l'apparition des premières pustules au bas des feuilles ; - Maintenir la protection si les conditions favorables persistent. 	
<p>Gale argentée <i>Helminthosporium solani</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - la contamination se fait avant la récolte, mais aucun symptôme ne s'observe sur les parties aériennes ; - Observation des taches circulaires d'aspect argenté, à contours irréguliers, à la surface du tubercule qui se couvre de fines ponctuations noires (sclérotés) ; - Fusion des taches sous température supérieure à 5°C et humidité relative supérieure à 90% ; - Présence d'un port dressé sur les sujets contaminés, et à l'aisselle des feuilles, la présence éventuelle de petits tubercules aériens. 	<ul style="list-style-type: none"> - Eviter les plantations trop précoces ; - Plantation en sol réchauffé et bien préparé ; - Utiliser les variétés moins sensibles, il est noté que les variétés précoces sont plus atteintes que les tardives ; - Récolter dès que la peau des tubercules est suffisamment formée ; - Ne pas laisser inutilement les récoltes en terre après défanage ; - Entreposer les tubercules secs dans un local frais et aéré, de même, de sécher les tubercules à la sortie de chambre froide ; - Traiter le plant avec des fongicides efficaces (spécialités à base de mancozèbre en particulier). 	
<p>Gale poudreuse <i>Spongopora subterranea</i></p>	<p>Sur racine : Formation de chancres sur les racines, blancs d'abord puis qui brunissent ensuite.</p> <p>Sur tubercule : Les symptômes ultimes de la gale poudreuse correspondent à de nombreuses petites dépressions liégeuses sur les tubercules, entourées de morceaux d'épiderme déchiré.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utiliser des plants sains ; - Pratiquer en cas de zones à risque, de longues rotations (au moins 5 ans) ; - Drainer les parcelles humides ; - Traiter les semences par des fongicides appropriés. 	




Elaboration des référentiels techniques et technico-économiques




<p>Fusariose :</p> <p><i>Fusarium roseum</i> <i>var. sambucinum</i></p> <p><i>Fusarium solani</i> <i>var. coeruleum</i></p>	<p>Sur tubercule :</p> <ul style="list-style-type: none"> - elle se manifeste en cours de conservation, provoquant la destruction du tubercule ; - les tissus touchés brunissent et se dépriment (déshydratation), pouvant aller jusqu'à présenter des stries concentriques, parfois ornées de coussinets mycéliens blanchâtres ; - Dessèchement progressif du tubercule jusqu'à donner un tubercule « momifié » de consistance dure. En revanche, en cas d'attaques bactériennes associées, les tubercules deviennent mous. <p>Sur coupe de tubercule :</p> <ul style="list-style-type: none"> - une pourriture marron qui se développe vers l'intérieur où des cavités internes tapissées de mycélium apparaissent. 	<ul style="list-style-type: none"> - Utiliser la semence saine et favoriser la vigueur des levées ; - Récolter dans un délai de trois à quatre semaines après le défanage ; - Limiter les blessures à la récolte et au conditionnement ; - Sécher les tubercules et veiller à la cicatrisation au début de conservation ; - Maîtriser la température et l'humidité des locaux de conservation ; - Traiter peu de temps après la récolte avec un fongicide à base de thiabendazole + imazalil pour contrôler toutes les souches, - Désinfecter les locaux et les matériels ; - Pratiquer une rotation de 5 ans minimum. 	
<p>Verticilliose :</p> <p><i>Verticillium dahliae</i></p> <p><i>Verticillium albo-atrum</i></p>	<p>Les symptômes en végétation s'expriment tardivement :</p> <p>Sur la partie aérienne :</p> <ul style="list-style-type: none"> - jaunissement des feuilles ; - flétrissement du feuillage qui se généralise ensuite à l'ensemble de la plante ; - le jaunissement ou le flétrissement peut ne concerner qu'un côté de la feuille, de la tige ou de la plante. <p>sur les coupes de tiges :</p> <ul style="list-style-type: none"> - coloration brunâtre des vaisseaux. <p>Sur coupe de tubercules :</p> <ul style="list-style-type: none"> - présence de taches brunes tout au long de l'anneau vasculaire, pouvant évoluer en cavités. <p>Sur les yeux de tubercules :</p> <ul style="list-style-type: none"> - peuvent présenter parfois des nécroses rose-brun. 	<p>Lutte chimique :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Absence de traitement chimique curatif efficace contre la verticilliose ; - Appliquer des traitements fongiques préventifs avant la plantation <p>Lutte culturale :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eviter la plantation dans des parcelles atteintes par la fusariose ; - Pratiquer une rotation minimale de 3 ans entre les cultures de solanacées ; - Utiliser des plants certifiés. 	

Elaboration des référentiels techniques et technico-économiques



Maladies bactériennes			
<p>La galle commune en relief : <i>Streptomyces scabies</i> <i>S.europaeiscabies</i> <i>S. stelliscabies</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Les pustules se manifestent par des chancres en dépression ou en relief, de tailles et d'aspects variables ; - Sur certaines variétés, les attaques peuvent se limiter à des symptômes en étoile. 	<ul style="list-style-type: none"> - Utiliser des cultivars résistants malgré la grande diversité des souches de streptomyces qui rend le développement de variétés résistante complexe ; - Eviter un sol à pH élevé qui favorise la croissance de <i>S. scabiei</i> et accroît la sévérité de la galle ; - Les pertes peuvent être significativement réduites dans des soles avec des niveaux de pH de 5.2 ou moins ; - Eviter un sol sec qui favorise la croissance de <i>S. scabiei</i>. Si l'humidité du sol est maintenue près de la capacité au champ durant 4 à 6 semaines après l'initiation des tubercules, l'infection par <i>S. scabiei</i> pourra être réduite ; 	
<p>La galle plate ou en liège <i>Streptomyces reticuliscabies</i> certaines souches de <i>S. europaeiscabies</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Epaississement de l'épiderme ; - Taches liégeuses qui peuvent couvrir la totalité du tubercule et finissent par éclater ; - Les racines ou les stolons, en cas d'attaque précoce, peuvent être aussi infectés. 	<ul style="list-style-type: none"> - Eviter les sols sablonneux ou à texture grossière qui sont plus à risque pour le développement de la galle à cause de leur faible capacité de rétention d'eau. - Pratiquer les rotations de 2 ou 3 ans avec des espèces qui peuvent réduire la galle commune (telle que du canola ou du colza qui ont permis de réduire entre 18 et 25% selon certaines études). - Utiliser des fertilisants soufrés et d'amendements organiques riches en azote qui ont démontré une bonne efficacité pour réduire la galle commune. 	
<p>Pourriture molle et jambe noire</p>	<p>Provoque en conditions plus chaudes un flétrissement et une pourriture brune à noire de l'intérieur des tiges.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Éliminer en végétation l'ensemble des plantes présentant des symptômes (épurations), • Éviter des fumures azotées excessives ainsi que des irrigations trop importantes, • Limiter les blessures de tubercules lors des manipulations car elles constituent des portes d'entrée pour les bactéries, • Éviter les excès d'humidité en séchant dès la récolte et en conservant en conditions aérées et sèches à basse température, • Proscrire le trempage et la coupe des plants. Bien sécher après les traitements contre la fusariose et le rhizoctone. 	

Elaboration des référentiels techniques et technico-économiques

Maladies virales			
<p>Le virus de l'enroulement foliaire de la pomme de terre (PLRV) : transmis par les pucerons.</p>	<p>Sur feuilles :</p> <p>S'il s'agit d'une infection de l'année :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les feuilles de l'apex de la plante s'enroulent légèrement et présentent un jaunissement. <p>S'il s'agit d'une infection de l'année précédente :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les feuilles de la base sont fortement enroulées et durcies, avec parfois une bordure violette due à la formation d'anthocyanes ; le port de la plante est plus dressé et les entrenœuds sont plus courts. On constate un jaunissement et parfois un nanisme de la plante. <p>sur tubercules :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les tubercules-mères se décomposent plus difficilement et les tubercules-fils restent de petite taille. - Des nécroses internes en réseau peuvent apparaître dans les tubercules de certaines variétés. 	<p>La lutte est essentiellement préventive :</p> <p>Lutte chimique :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utilisation d'insecticides systémiques et de contact pour réduire considérablement la propagation par les pucerons, que ce soit par traitement foliaires de plants, ou dans les sillons. <p>Lutte culturale :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utilisation de semence certifiée exempte de virus provenant de cultivars non vulnérables ; - Défaner les plants avant l'arrivée des pucerons ; - Mise en terre tôt au printemps ; - Réduction des apports d'azote ; - L'utilisation d'un rotobatteur, d'un coupe-racines et de défanants chimiques assure une élimination rapide des pucerons pendant la période de croissance active des plants tôt dans la saison ; - Surveillance des pucerons à l'aide de pièges ; - Contrôler et éliminer tous les plants présentant les symptômes cités. 	 <p style="text-align: center;">Infection primaire</p>  <p style="text-align: center;">Infection secondaire</p>
<p>Le virus Y de la pomme de terre (PVY) Transmis par pucerons et par semence</p>	<p>Sur feuilles :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elles sont les premières à manifester les symptômes ; elles sont plus petites, d'aspect gaufré et des mouchetures qui varient du vert pâle au vert foncé. 	<ul style="list-style-type: none"> - Cultiver les végétaux non hôte (comme le soja) en périphérie des champs peut aider à réduire la propagation des virus ; - Prévoir en post-récolte les niveaux possibles d'infection ; - Pulvériser régulièrement une huile minérale. Une bonne couverture de celle-ci est essentielle pour une réduction effective de la propagation de PVY ; - Utiliser des insecticides pour éliminer les vecteurs des virus. 	

Ravageur	Symptômes	Méthode de lutte	Photo
<p>Nématode <i>Ditylenchus dipsaci</i></p>	<p>Sur tige : Apparition de renflement et de distorsions sur les jeunes tiges.</p> <p>Sur feuille : Les pétioles s'épaississent et les feuilles deviennent petites et difformes</p> <p>Sur tubercule : Sur l'épiderme, apparition de petites nécroses ; En coupe longitudinales, les nécroses s'enfoncent profondément suite à l'envahissement des tissus par les nématodes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - La lutte contre le genre <i>ditylenchus</i> reste très difficile vu le leur faculté de résistance dans le sol, - La destruction des restes de la culture pour réduire les niveaux d'inoculum puisque le nématode se conserve dans les tissus infectés. - La désinfection chimique pour détruire des formes de résistance du nématode à ce niveau. Cependant, cette méthode n'a qu'une efficacité limitée à cause du coût du traitement et de l'importance de l'inoculum dans le sol. 	
<p>Les nématodes à galle : transmis par tubercules. <i>Meloidogyne incognita</i> <i>M. javancia</i> <i>M. arenaria</i> <i>M. hapla</i> <i>M. chitwoodi</i> <i>M. fallax</i></p>	<p>Sur racine :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boursoufflures à la surface. <p>Sur tubercule :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Galles causées par des femelles globuleuses qui pondent leurs œufs dans des masses mucilagineuses. 	<ul style="list-style-type: none"> - Utiliser des tubercules exempte de ces nématodes. - Alternner entres des plantes résistantes ou non hôte avec la culture de pomme de terre. - Lutte chimique en cas de fortes infestations. - Ne pas importer des semences qui proviennent de régions infestées par les espèces de quarantaines <p><i>M. fallax</i> et <i>M. chitwoodi</i>.</p>	
<p>Taupin : Coleoptère <i>Agriotes obscurus</i> <i>A. lineatus</i> <i>A. sputator</i> <i>A. ustulatus</i></p>	<p>Sur l'ensemble du champ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diminution de la densité du peuplement végétal . <p>Sur tubercule :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perforation des tubercules. 	<ul style="list-style-type: none"> - Utilisation d'insecticides du sol au moment de la plantation. Ces traitements ne couvrent pas la protection des tubercules en cas d'attaques tardives ; - Procéder à l'évaluation du niveau d'infestation, grâce à des appâts avant de recourir aux produits chimiques. 	

Elaboration des référentiels techniques et technico-économiques

<p>Teigne de la pomme de terre : lépidoptère <i>Phthorimaea operculella</i></p>	<p>Sur tubercules :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apparition de fine galeries tapissées de soie et d'excréments ; - Au terme ultime de l'évolution, le tubercule disparaît sous l'action de pourritures secondaires, sèches ou humides bactériennes ou cryptogamiques 	<ul style="list-style-type: none"> - Labours : de fréquents labours avant la plantation de façon à bien ameublir le sol et à pulvériser les mottes sont recommandés ; - Buttage des pommes de terre quand elles atteignent une belle taille sans pour autant craqueler le sol ; - A défaut d'un bon buttage, il faut réaliser une plantation profonde pour réduire le danger d'atteinte par les chenilles ; 20 à 25 cm étant la meilleure profondeur ; - Rotation culturale : ramène la pomme de terre sur le même terrain tous les 5 ou 6 ans. On évitera également le voisinage des cultures de pomme de terre avec l'aubergine qui représente un foyer permanent d'infestation ; - les tubercules seront ensachés et les sacs enlevés le plus rapidement possible surtout par les temps chauds ; - Hygiène culturale : évacuer les tubercules abimés ou petits et les fanes pour éviter les attaques de mildiou, éliminer les solanacées sauvages ; - Protection des tubercules stockés : tri des tubercules (prophylaxie) ; - Lutte chimique : utilisation des produits homologués par l'ONSSA. 	
<p>Pucerons <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Aphis nasturii</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - les prélèvements de la sève entraînent de pertes de rendement ; - Transmission du virus Y et le virus de l'enroulement. 	<ul style="list-style-type: none"> - Utiliser des hyménoptères parasitoïdes ; - Ou des prédateurs spécifiques comme la coccinelle (consomme 60 pucerons par jour), les chrysopes (Jusqu'à 500 pucerons au cours de sa vie) et les syrphes (De 400 à 700 pucerons au cours de sa vie) ; - Lutte chimique : utilisation des produits homologués par l'ONSSA. 	

2.9. Contrôle des mauvaises herbes

Dans la culture de pomme de terre, les adventices utilisent l'humidité, les éléments fertilisants et la lumière et par conséquent ils réduisent le rendement, déprécient la qualité des tubercules, et maintiennent une humidité favorable au développement des maladies (en particulier du mildiou) et des ravageurs.

2.9.1. Herbicides

Herbicides de prélevée : Linouren, métribuzine et prosulfocarbe sont des herbicides homologués au Maroc pour le désherbage de pré-levée des adventices et de la culture. Ces herbicides agissent sur les semences des adventices en cours de germination. Il ne faut pas oublier que l'application de ces herbicides de pré-levée nécessite : a) un sol bine travaillé (sans mottes) b) une humidité de sol suffisante et c) un matériel de traitement bien réglé.

Herbicides de post-levée : Rimsulfuron est un herbicide de post-levée des adventices et de la culture. Ce produit est efficace sur les très jeunes plantules adventices dicotylédones et graminées annuelles. Plusieurs herbicides anti-graminées sont homologués : cléthodime, cycloxydime, fluazifop, haloxyfop, propaquizafop, quizalofop, etc. ces herbicides sont réputés pour leur excellente efficacité sur différentes graminées annuelles comme les repousses de céréales, l'avoine stérile... mais, il faut faire attention à l'effet parapluie de la culture : toutes les plantules adventices cachées sous le feuillage de la culture ne vont pas recevoir une dose létale des herbicides.

2.9.2. Binages et buttages

Les opérations de binage et de buttage sont réalisées en vue de réduire les infestations par les adventices (Tanji, 2012).

Le premier binage avec la sape est fait une à deux semaines après la levée de la culture. Il permet essentiellement l'aération du sol et la destruction des adventices. Un deuxième binage, également avec la sape ou la charrue à traction animale, est possible si nécessaire deux à trois semaines après le premier binage.

Le binage et le buttage avec le tracteur sont possibles, mais il faut a) équiper le tracteur de pneus étroits, et b) régler la bineuse de façon à éviter tout dégât aux feuilles, racines ou stolons. En fait, les dégâts retardent le développement de la culture et augmentent le risque des maladies.

2.10. Récolte

2.10.1. Défanage

Le défanage consiste en une destruction des parties aériennes, suivie d'un maintien en terre des tubercules avant la récolte. La destruction des fanes est obligatoire en production de plants, pour limiter la contamination des tubercules par les maladies à virus et produire des plants de petit et moyen calibre de valeur marchande plus élevée. Mais elle est également indispensable pour les autres types de pomme de terre pour limiter les risques de contamination des tubercules par le mildiou en fin de végétation, produire des plants de calibre souhaité et de teneur en matière sèche convenable, faciliter les travaux de récolte, favoriser la formation de l'épiderme et réduire la sensibilité des tubercules aux endommagements mécaniques.

Dans le cas de la pomme de terre de consommation, il est souhaitable de procéder au défanage. Alors qu'il est obligatoire de décrouter la durée de la culture en détruisant les fanes (enlèvement des tiges et des feuilles) pour les pommes de terre destinées à la production des plants.

Pour les pommes de terre de consommation, le défanage permet de contrôler le grossissement des tubercules et leur teneur en matière sèche en fonction de leur destination.

Pour les tubercules destinés au stockage, cette façon culturale favorise la subérisation (cicatrisation de petites blessures) et elle réduit par conséquent l'incidence de maladies ; les tubercules deviennent plus tolérants aux blessures mécaniques lors de la récolte.

La date de défanage peut être alors déterminée par des contrôles, au cours de végétation, du grossissement des tubercules, et leur teneur en matière sèche, tout en tenant compte du fait qu'en raison d'une légère reprise en eau des tubercules, le taux de matière sèche diminue d'environ 1 à 1.5% après défanage.

Le délai entre le défanage et la récolte est de deux à quatre semaines.

Trois types d'opérations de défanage sont possibles : le défanage mécanique, réalisé par des faucheuses, broyeuses ou arracheuses de fanes ; le défanage thermique (il reste peu utilisé mais est conseillé pour réduire l'utilisation d'intrants chimiques), et le défanage chimique.

2.10.2. Maturité

La maturité de la pomme de terre est fonction du temps écoulé depuis sa plantation et diffère selon la variété. La durée complète du cycle végétatif varie d'environ 80 à 150 jours. La maturité s'annonce par une couleur jaunâtre du feuillage. Au moment de la pleine maturité, on peut observer un fanage complet des tiges et des feuilles. Le tubercule se détache alors facilement de la plante, et la pelure ne se détache plus aisément par frottement du doigt.

2.10.3. Récolte

- Récolte manuelle

La récolte peut s'effectuer avec une arracheuse. L'aligieuse permet de faire une récolte manuelle avec un tri sur le sol et la ramasseuse trieuse permet une récolte mécanique avec triage sur la machine. Le tri permet le calibrage (élimination des tubercules trop petits ou trop gros) et l'élimination des tubercules présentant des défauts (déformation, verdissement, attaque de taupins, tâches de maladies, blessures...).

Afin de limiter l'incidence de maladies après la récolte et de faciliter le travail, l'arrachage se fait de préférence par temps sec et avec beaucoup de soin pour éviter les blessures de la pelure des tubercules. Après l'arrachage, il est recommandé de laisser les tubercules se ressuyer au soleil pendant quelques heures dans le but de faciliter la subérisation. Eviter un soleil trop ardent et une exposition allant au-delà de quelques heures. Ensuite, on débarrasse si nécessaire les tubercules de la terre et on les trie. Les tubercules de plus de 50 g conviennent à la vente, ceux qui pèsent entre 30 et 50 g peuvent être conservés comme semences. Quant aux tout petits (la grenaille), ils peuvent servir à l'alimentation des animaux.

- Récolte mécanisée

La récolte se fait à l'aide d'arracheuses mécaniques, dont les performances (vitesse de travail et prévention des endommagements) ont été considérablement accrues au cours des dix dernières années. L'opération consiste successivement à :

- soulever le billon dans lequel sont les tubercules,
- le désagréger pour isoler les corps étrangers (mottes, pierres, fanes...),
- isoler les tubercules,
- les déposer sur le sol pour la mise en sac ou les vider en vrac dans une remorque.

Ces opérations sont réalisées le plus souvent en une seule fois à l'aide d'une machine comprenant un soc souleveur, un organe séparateur (souvent constitué d'un tablier élévateur formé de barres transversales et animé de mouvements de secouage) et un tapis roulant qui entraîne les tubercules vers la remorque (ou vers un organe trieur et ensacheur sur les machines les plus perfectionnées).

3. Culture d'oignon

3.1. Les exigences agro écologiques

La température optimale de germination est de 15-18°C.

La levée dure de 8 à 20 jours selon les conditions climatiques, elle est lente aux températures basses : 30 jours à 5°C.

Le zéro de végétation est bas : 1,5°C. La plante est sensible au gel pendant la phase d'installation surtout en situation d'humidité excessive.

La culture n'est pas exigeante en sols, à l'exception d'une texture argileuse pauvre en humus (contraintes d'adhésivité et de plasticité des argiles), alors que les sols sablo-limoneux bien fertilisés favorisent la précocité en plus de l'amélioration de la productivité.

Le pH convenable est proche de la neutralité (6,5 à 7,8). Les oignons réussissent moins bien dans les sols dont le pH est inférieur à 6,5. Il est alors nécessaire de procéder à un chaulage approprié pour éviter des blocages avec certains éléments fertilisants.

Il faut un minimum de 4 à 5 ans entre deux Allium pour se prémunir de certaines maladies et certains ravageurs comme le nématode du bulbe.

Pour des raisons sanitaires le précédent doit laisser peu de résidus de culture ou des résidus bien décomposés.

Ainsi, les rotations doivent être de 3 à 5 ans pour se prémunir des nématodes communs des tiges (*Ditylenchus dipsaci*) et de différents champignons (*Sclerotium cepivorum*, *Botrytis* ...). Ce délai de rotation inclut également les autres alliacées (ail, poireau ...). (Hallouin I., 2004)

Précédents favorables : céréales, pomme de terre, betterave, cultures sarclées

Précédents défavorables : autres alliacées, pois, luzerne, prairie (problèmes d'enherbement).

3.2. Variétés

Les variétés connues au Maroc sont la rouge des Doukkala et la jaune de Valence. Il faut faire attention au choix des variétés en évitant d'importer des variétés de jours longs qui nécessitent plus de 15-16 heures pour leur bulbaison; cette durée de jour n'est pas commune au Maroc; il faut plutôt choisir des variétés dont la photopériode critique est faible. Puisque l'oignon est une plante de jour long pour sa bulbaison, il suffit de dépasser la longueur de jour critique pour que le bulbe se forme, sinon, on n'aura que de la végétation.

Tableau 6 : Variété par région et par zone homogène

Région	Zone homogène	variété
Tanger Tétouan Al-Hoceima	Zone homogène rifaine (CCA de Ben Kerrich)	Variété locale
	Zone homogène du Tangérois	Variété locale oignon beldi

(Diagnostic participatif, 2017)

3.3. Semis

On distingue deux types d'implantation. Le semis de graines pour la conservation en raison des variétés disponibles et la plantation de bulbille favorable pour un développement plus rapide, qui favorise les interventions de désherbage.

Elaboration des référentiels techniques et technico-économiques

La densité de semis sur la ligne sera de 35 à 40 graines au mètre linéaire pour assurer un peuplement de 25 à 30 oignons au mètre linéaire. En bulbille, on visera une densité de 20 oignons au mètre linéaire.

Tableau 7 : période de semis de l'oignon selon les zones homogènes

Région	Zone homogène	Période d'installation de la pépinière
Tanger Tétouan Al-Hoceima	Zone homogène rifaine (CCA de Ben Kerrich)	La pépinière est installée en janvier, et la transplantation a lieu en mi-mars / avril, pour être récolté en juillet.
	Zone homogène du Tangérois	Deux périodes de production de l'oignon dans la zone à savoir : <ul style="list-style-type: none">- Plantation de janvier et récolte en mai. La pépinière est installée en octobre. C'est la culture dite « Baâlia » ou « bour » (non irrigué).- Plantation d'avril et récolte en juillet. La pépinière est installée en janvier/février. La culture de l'oignon est conduite dans ce cas en irrigué. Elle est installée à proximité des puits ou des cours d'eau et l'irrigation se fait à la main à l'aide de tuyaux flexibles. Dans les deux cas, les superficies réalisées par exploitation sont très réduites (0,2 à 0,3 ha par en général).

(Diagnostic participatif, 2017)

3.4. Travail du sol

Une bonne préparation est un facteur important qui concourt à la réussite de la culture. Il repose au départ sur la qualité du labour qui devra être réalisé en tenant compte des caractéristiques propres à la terre de façon à présenter lors de sa reprise au printemps un ensemble friable mais sans excès pour éviter les phénomènes de compacité. On recherchera donc :

- En surface : une terre fine sans excès, si la battance est à craindre, mais suffisante pour assurer un contact étroit entre la graine et la terre
- En profondeur : un profil sans cavité

Le sol doit être parfaitement ameubli, drainé et enrichi d'humus. Un labour à 15 – 18 cm de profondeur suffit pour éviter la présence des adventices au semis. Cette préparation du sol doit être effectuée 2 à 3 semaines avant le semis ou la plantation.

Tableau 8 : Travail du sol par zone homogène

Région	Zone homogène	Travail du sol
Tanger Tétouan Al-Hoceima	Zone homogène rifaine	Les travaux de préparation du sol sont réalisés à l'aide de la charrue à disques, et sont suivis par un passage de cover-crop.
	Zone homogène du Tangérois	La culture de l'oignon, dans la zone homogène de Khémis-Anjra, se fait encore de manière très traditionnelle. Les travaux de préparation du sol sont réalisés à l'aide de la traction animale (l'araire) et à la houe.

(Diagnostic participatif, 2017)

3.5. Fertilisation

- ✓ Matière organique

Elaboration des référentiels techniques et technico-économiques

Il est préférable de ne pas apporter de matière organique peu compostée avant une culture d'oignon car cela risquerait d'augmenter la sensibilité de la culture aux différents agents de pourriture (Sclerotium). Par contre, les apports de matière organique réalisés sur les cultures précédentes seront favorables à la culture d'oignon si elle est bien décomposée.

✓ Fertilisation minérale

La formule de fond est de 80-70-150 kg/ha, respectivement de N, P2O5 et K2O. La formule globale est de 250-100-350 kg/ha. La différence étant la fumure de couverture. L'azote peut être apporté sous forme d'ammonitrate, P sous forme de supertriple et K sous forme de sulfate de potasse. On conseille la localisation manuelle des engrais au milieu de la raie. On peut faire jusqu'à 5 fractionnements de N et de K. L'apport de soufre est important pour l'oignon de conservation. L'élément S aide à la bonne conservation des bulbes.

Un apport complémentaire d'engrais azoté peut s'effectuer à l'implantation. À la période de Mars-Avril, la minéralisation est lente et la disponibilité de l'azote sera progressive jusqu'au début de la bulbaison (stade 8 à 10 feuilles). Ainsi, un apport complémentaire de potasse et de magnésie voire de phosphore, pourra être éventuellement réalisé. Les besoins globaux de la culture sont estimés à 120 unités en azote, 80 unités en acide phosphorique, 160 unités en potasse.

Le tableau suivant présente le programme de fertigation de l'oignon :

Tableau 9 : Programme de fertigation de l'oignon (kg/ha)

Stade de développement de l'oignon	Nombre de jours	Éléments (kg/ha)		
		N	P2O5	K2O
10 jours après semis ou transplantation jusqu'à stade 4 feuilles	15	13	22	10
Développement végétatif (du 4 feuilles jusqu'à 8 feuilles)	30	95	27	55
Début de bulbaison (du 8 feuilles jusqu'à 15 feuilles)	49	102	46	117
Développement du bulbe	49	41	6	168
Total	143	251	101	350

3.6. Irrigation

L'oignon est une culture qui nécessite des conditions d'alimentation hydrique non limitant. Les besoins hydriques de l'oignon sont compris entre 450 mm et 650 mm. Le volume à apporter par irrigation et les fréquences d'apport se déterminent en fonction de la nature du sol, du stade de la culture et de la demande climatique.

Les besoins en eau de la culture augmentent à partir du stade 4 feuilles. La culture est très sensible au stress hydrique pendant la formation du bulbe. Le coefficient cultural va de 0.5 à 0.8 pendant la phase de croissance végétative (jusqu'au stade 4 feuilles). Il est autour de 1 pendant la bulbaison et on arrête l'irrigation durant la période proche de la maturité-récolte.

Pour un oignon de conservation, l'irrigation doit être arrêtée à l'approche de la maturation du bulbe, c'est à dire à partir du stade plant couché. L'arrêt des arrosages va stopper la croissance végétative, aider la maturation, mais aussi favoriser une récolte groupée et une meilleure conservation.

3.7. Désherbage

La culture de l'oignon couvre peu le sol et peut être fortement concurrencée par les plantes adventices.

Elaboration des référentiels techniques et technico-économiques

Le désherbage sera réalisé en fonction du mode d'implantation de la culture, avec ou sans paillage. Sans paillage, les méthodes utilisées sont les mêmes pour une plantation en mottes, pour un semis direct et pour une plantation de bulbilles :


Tableau 10 : Méthodes de désherbage

Méthodes de désherbage	de	Caractéristiques
Faux semis		✓ Avant mise en place de la culture (semis direct, plantation de bulbilles ...) Le faux semis est fortement conseillé. Les plantes adventices sont détruites par passage d'un outil en surface ou par désherbage thermique. Une solarisation peut être pratiquée avant les semis de fin d'été, début d'automne. La méthode de l'occultation peut-être aussi une méthode de désherbage avant semis.
Désherbage mécanique en cours de culture		En cours de culture sur des plantes bien racinées, des passages de bineuse ou herse étrille permettent de désherber en inter rangs. Attention cependant de ne pas abîmer le système racinaire présent sur les premiers centimètres du sol. Sur le rang, un désherbage manuel peut être nécessaire. Le binage permet également de garder une bonne structure superficielle du sol, essentielle en début de culture si semis direct.
Désherbage thermique		Le désherbage thermique peut-être utilisé en cours de culture car l'oignon supporte la flamme directe à certains stades de son développement : <ul style="list-style-type: none">• Du semis au stade crochet (stade A à B dans le tableau) (= début de la levée, le cotylédon sort de terre il est replié en forme de crochet). Attention cependant au stade crochet à l'intégrité du cotylédon qui est primordiale pour le devenir de la plante.• Du stade chute de la première feuille au stade début de la bulbaison (stade F à G)
Désherbage chimique		En agriculture conventionnelle, plusieurs produits sont utilisables en pré et en post levée. Une large gamme des produits chimiques sont utilisés pour le désherbage chimique. Parmi ces produits figurent l'acide sulfurique dilué, la Cyanamide à raison de 75 kg/ha, Dinosol 50, Prévanol 56, appliqués avant l'émergence de l'oignon (Skiredj, 1978 cité par El Alami F., 2009).



(Source : Fiche culturale oignon, Juin 2014)



Une bonne combinaison des interventions (faux semis, thermique, binage mécanique) sera la seule solution pour contrôler les mauvaises herbes. Le désherbage thermique permet de contrôler les premiers stades de la culture. Ces passages exigent une main d'œuvre importante (150 heures/ha). Les binages mécaniques peuvent commencer dès que les oignons sont suffisamment développés pour ne pas être enterrés (stade 2 feuilles). On réalise des binages réguliers (compter 3 passages) dans les entre-rangs. (Ajaanid I., 2016)

3.8. Maladies et ravageurs de l'oignon

Maladies	Symptômes	Méthode de lutte	Photo
<p>Mildiou</p>	<p>feuillage vert clair, taches allongées, apparition d'un duvet gris violacé (fructifications), jaunissement des parties atteintes, cassure de la partie supérieure des feuilles, réduction de la surface photosynthétique, d'où des pertes de rendement à la récolte.</p>	<p>Lutte chimique elle repose sur des traitements préventifs car il n'existe pas de traitements curatifs efficaces. La protection commence dès que les conditions climatiques sont favorables. Utilisation des produits de contact en général en début de culture puis utilisation des fongicides hauts de gamme dès le début de la bulbaison (stade le plus sensible à la maladie) pour bien protéger le bulbe en formation. La cadence des traitements varie en fonction des produits utilisés : entre 7 et 10 jours. Il est conseillé d'arrêter la protection au stade tombaison car à partir de ce stade, les attaques ne seront plus préjudiciables pour la culture.</p> <p>Lutte génétique Des variétés résistantes sont disponibles depuis quelques années sur une gamme encore restreinte mais la création variétale continue sur ce thème. Il convient néanmoins de prendre des précautions par rapport au caractère monogénique de cette résistance et de son contournement potentiel.</p> <p>Mesures prophylactiques</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matériel végétal : un trempage des plants dans de l'eau chaude (40°— 44°C) avant plantation permet d'éliminer les formes de conservation présentes sur les bulbes. • Choix de la parcelle : rotation au minimum de 4 ans recommandée, ne pas planter à proximité d'autres parcelles d'échalote ou d'oignon pour limiter les sources de contamination ou sur des zones mal drainées. • Conduites culturales : éviter les plantations trop serrées afin d'assurer une bonne aération sur les planches de cultures, raisonner la fertilisation azotée pour éviter les excès. • Éliminer les déchets de cultures qui sont des sources potentielles de la maladie et les adventices sur les planches de cultures afin de favoriser l'aération de la culture. 	

Elaboration des référentiels techniques et technico-économiques

<p>Brûlure des feuilles sur oignon (<i>Botrytis squamosa</i>)</p>	<p>Le champignon peut affecter tous les stades de la culture (du semis à la récolte). Les symptômes sont observés uniquement sur le feuillage, ils se manifestent sous forme de taches blanches rondes à ovales de 1 à 5 mm et légèrement en creux évoluant jusqu'au dessèchement des feuilles. L'infection commence au niveau des feuilles les plus âgées et à leur extrémité provoquant des brûlures, pour évoluer sur l'ensemble du feuillage. La maladie peut être confondue avec des brûlures d'herbicide ou des blessures</p>	<p>Lutte chimique Il est recommandé de traiter préventivement contre le <i>botrytis squamosa</i>, dès que le feuillage atteint 15 à 20 cm de hauteur</p> <p>Mesures prophylactiques</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utiliser des plants sains, en effet les bulbes peuvent être porteurs de l'agent pathogène • Favoriser les rotations longues, au minimum 4 à 5 ans entre deux oignons ou autre culture sensible. • Eviter les excès d'azote. 	
<p>Pourriture du collet sur Oignon</p>	<p><i>Botrytis allii</i> est une maladie qui se développe en cours de culture sur les Allium. Elle est responsable de pourritures en cours de stockage des bulbes.</p> <p>Sur Oignon, les symptômes sont essentiellement visibles lors de la conservation. Les dégâts se présentent sous la forme de moisissures gris-foncé sur les écailles allant jusqu'au cœur du bulbe si la maladie est avancée</p>	<p>Lutte chimique Il est recommandé de traiter en préventif dès le début de la période à risque soit 1 mois à 15 jours avant la tombaison.</p> <p>Mesures prophylactiques Afin de limiter l'incidence de la maladie et d'éviter les contaminations primaires, il est conseillé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • privilégier des rotations de 3 ans (voire 5 ans) entre deux alliacées ; • trier les bulbes avant la plantation ; • éliminer les déchets de cultures. 	

Ravageurs	Dégâts	Méthode de lutte	Photo
Mouche mineuse	Ils sont principalement dus aux larves qui minent les feuilles. Ils sont d'autant plus importants que la plante est jeune. Une forte attaque sur des oignons développés peut être aussi préjudiciable car les galeries réduisent l'activité photosynthétique et peuvent aussi être des entrées pour plusieurs maladies cryptogamiques ou bactériennes	Quand le plant est jeune (jusqu'au stade 5-6 feuilles), il faut traiter dès l'apparition des symptômes (galeries sur les feuilles) sous peine de perdre rapidement la culture	
Les Thrips (Thrips tabaci, Thrips palmi et Frankliniella occidentalis.)	Ils sont causés à la fois par les larves et les adultes. Ils attaquent l'épiderme des feuilles et sucent la sève des plantes. Cela provoque de petites taches blanches sur les feuilles. L'oignon est très sensible aux attaques de thrips entre la levée et le stade 5 feuilles. Lorsque les feuilles sont encore de petite taille, les piqûres de thrips peuvent dessécher la plante et compromettre fortement le rendement.	<p>Lutte chimique :</p> <p>Traiter sans tarder les zones où les populations sont supérieures au seuil. Si on prévoit de la pluie à court terme, attendre après la pluie puis vérifier si une intervention est encore justifiée. Il est préférable de ne traiter que les zones où le seuil d'intervention est atteint pour protéger les ennemis naturels présents.</p> <p>On recommande de faire systématiquement un second traitement 5 à 7 jours après le premier. Ce traitement a pour but d'atteindre les thrips qui étaient sous forme d'œuf (inséré dans la feuille) ou de nymphe (dans le sol) au moment du premier traitement. Cinq à 7 jours plus tard, refaire le décompte de la population pour vérifier s'il y a lieu d'intervenir à nouveau.</p> <p>Mesures prophylactiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Éviter de planter les oignons près des champs de foin et de céréales à paille. • Tondre fréquemment les bordures des champs et les zones enherbées. • Irriguer les champs d'oignons lors des périodes sèches. L'irrigation par aspersion, tout comme les orages forts, a pour effet de détruire un grand 	

Elaboration des référentiels techniques et technico-économiques

		<p>nombre de thrips. De plus, des oignons dont la croissance est retardée par le manque d'eau sont davantage affectés par les thrips, la production de nouveau feuillage ne permettant plus de compenser pour la surface foliaire endommagée par l'insecte. On sait également que les surfaces foliaires touchées perdent plus d'eau par transpiration que les surfaces intactes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Détruire les oignons infectés. Les thrips peuvent survivre sur les collets des oignons durant l'entreposage de sorte que, par la suite, les repousses sur les tas de rebus au printemps peuvent leur servir de sites de multiplication. 	
<p>Le nématode des tiges <i>Ditylenchus dipsaci</i> Filipjev (Tylenchida: Tylenchidae)</p>	<p>Les individus se nourrissent des suc cellulaires qu'ils aspirent avec leur stylet après avoir injecté leur salive dans les cellules. Les substances toxiques contenues dans la salive provoquent des nécroses et des déformations des tissus. Les attaques de <i>D.dipsaci</i> provoquent en général de symptômes de gonflement, de décoloration, de distorsion et de malformation des organes.</p> <p>Sur oignon et ail, les symptômes se traduisent par un jaunissement des feuilles et de la pseudotige, un gonflement de la pseudotige, une croissance en hauteur altérée, un rabougrissement des tissus de la base de la pseudotige, un écartement des écailles au niveau du plateau et un écartement des bulbes qui deviennent mous dans le cas de l'oignon.</p>	<p>Pour éviter d'introduire le nématode, inspectez les oignons à repiquer pour vous assurer qu'ils sont exempts de maladie avant la plantation. Si le nématode est présent dans le sol, la fumigation peut représenter un bon moyen de contrôle. Il importe d'enlever et de détruire entièrement les tas de déchets végétaux, les resemis d'oignons et les adventices hôtes pour réduire l'incidence de ce nématode. En outre, une rotation des cultures sur quatre ans en utilisant des espèces non-hôtes telles que les épinards, les carottes, les betteraves, les crucifères, les laitues ou les céréales, s'est avérée efficace.</p> <p>Pour lutter contre les nématodes, il faut utiliser les produits homologués par l'ONSSA. Un seul produit est homologué par l'ONSSA et il s'agit de :</p>	

3.9. Récolte

La récolte de l'oignon est comme suit :

- **Récolte de l'oignon de conservation**

La récolte de l'oignon de conservation est une étape primordiale pour la qualité de sa conservation. Une récolte au bon stade permettra d'éviter la germination et les attaques parasitaires en cours de conservation. Pour une qualité de conservation optimale un équipement est nécessaire pour le séchage et le stockage des oignons.

Si on dispose d'un équipement pour le séchage, l'oignon doit être récolté lorsque le feuillage est sec au deux tiers (3 à 4 feuilles vertes subsistent, le feuillage est tombé). C'est le stade d'arrêt de croissance, les racines ne retiennent plus le bulbe au sol.

Si on ne dispose pas d'équipement pour le séchage des oignons après récolte, la récolte des oignons sera alors réalisée plus tard à sur-maturité en veillant cependant à ce que les bulbes ne restent pas trop longtemps en terre car ils peuvent être attaqués par des champignons ou des insectes saprophytes.

La récolte s'effectue en trois temps :

- Coupe des feuilles à 12-20 cm au dessus des bulbes
- Soulèvement des bulbes qui sont ensuite mis en andains pour un séchage au champ pendant 5 à 7 jours s'il n'y a pas de pluie.
- Reprise des andains et chargement

Une fois récoltés, les oignons finiront de sécher en utilisant une ventilation mécanique ou naturellement si on ne dispose pas de matériel.

- **Récolte de l'oignon frais botte**

Les cébettes et oignons sont récoltés manuellement pour ne pas abîmer les jeunes feuilles. Après épluchage et lavage, les cébettes sont vendues en bottes de 4-6 cébettes.

Les oignons sont récoltés en un ou plusieurs passages en commençant par les bulbes les plus gros. Ils sont vendus en bottes de 3-4 oignons. La première tunique des bulbes est enlevée et les oignons sont lavés. Les feuilles sont parfois coupées si le marché le demande.

Pour les oignons frais vendus en vrac. Les feuilles sont coupées au niveau du collet. Ce mode de commercialisation est moins courant mais certains oignons qui n'ont pas pu être commercialisés en bottes pourront être vendus en vrac même si le feuillage commence à se ramollir au niveau du collet.

3.10. Séchage

3.10.1. Pré-séchage au champ

Pour l'oignon de conservation, après arrachage et mise en andain, et en l'absence de pluie annoncée, un pré-séchage au champ de 5 à 7 jours, pour enlever le maximum d'eau du feuillage, commencer à résorber les collets, peut-être effectuer. En conditions à risques de pluie importants, si on dispose de ventilation, on n'hésitera pas à rentrer les oignons sans pré-séchage au champ. C'est le meilleur moyen qu'ils ne soient pas tâchés, terreux.

3.10.2. Séchage

Lors d'une récolte à l'optimum de maturité, le pré-séchage au champ doit être complété par un séchage avant mise en conservation.

❖ **Séchage naturel**

Sans équipement, le séchage peut se faire en étalant les bulbes sur une bâche sous un tunnel ou dans un bâtiment bien ventilé. L'efficacité de ce séchage est alors dépendante des conditions climatiques. Les manipulations et le travail sont plus importants. La qualité du résultat n'est pas garantie car, sans ventilation dynamique, le collet est plus long à sécher ce qui permet au botrytis, présent naturellement sur cette partie de la plante, de continuer sa progression vers l'intérieur du bulbe et les années les plus humides, de coloniser les écailles interne (plaques noires, écailles internes noirâtres).

❖ **Séchage forcé**

Un séchage forcé garanti un meilleur résultat. C'est le seul moyen de lutte véritablement efficace contre le botrytis allii qui ne se développe qu'en stockage. En conventionnel, les traitements fongicides au champ sont inefficaces contre ce botrytis dont les inoculations furtives (sans symptômes) ont lieu au cours du cycle végétatif.

Pour des volumes restreints, une installation simple de ventilation forcée avec un ventilateur dans un caisson permet d'atteindre facilement cet objectif à coût réduit.

Les caisses ou pallox sont disposés ou empilés sur les claires voies du caisson afin d'y être ventilées.

Les caractéristiques à respecter sont un débit d'air de 150 m³ d'air /h/ m³ d'oignon (environ 500 kg) à une pression de 10 mm CE (colonne d'eau) par m de hauteur de stockage afin que l'air puisse traverser correctement les oignons.

Au démarrage de la ventilation, l'optimum de température de l'air se situe entre 25 et 30° avec une hygrométrie de 65 à 80 %.

Après élévation à la température de consigne du volume stocké (25 à 30°c selon maturité), la durée de séchage est de 4 à 6 jours pour obtenir un feuillage sec, craquant et un collet qui ne roule plus sous les doigts et qui soit fermé afin de se prémunir efficacement contre le botrytis allii.

Une fois secs, les oignons sont maintenus et ventilés par intermittence pendant 15 jours à 3 semaines à 18-20°c afin de terminer et approfondir le séchage du collet et de le fermer correctement.

4. Rentabilité économique

4.1. Méthode de calcul de la rentabilité d'un hectare des cultures maraichères

L'étude de la rentabilité des parcelles des cultures maraichères (pomme de terre, d'oignon et de tomate) repose essentiellement sur l'analyse des charges, des produits et des marges par culture.

4.1.1. Les charges de production

Les charges de production incluent :

Les charges variables, aussi dénommées charges opérationnelles, sont constituées des postes suivants:

- Charges d'intrants agricoles (semences + fertilisants + produits phytosanitaires) : ces charges sont les plus représentées dans la structure des charges totales. Elles dépendent des quantités nécessaires).

Le calcul de ces charges peut se faire comme suit :

$$C1 = (QA1 \times PA1) + (QA2 \times PA2) + (QA3 \times PA3) + (QAi \times PAi)$$

Où :

QA_i = Quantité d'intrant i utilisée pour l'entretien de la culture

PA_i = Prix de l'intrant i (les frais du transport sont inclus)

- Charges de main d'œuvre : Elles dépendent du nombre d'opérations effectuées. Le calcul de ces charges peut se faire comme suit :

$$C2 = (\text{Nombre d'ouvriers} * \text{Rémunération journalière} * \text{Nombre de jours travaillés})$$

- Charges liées aux frais de location du matériel agricole pour effectuer les opérations suivantes (Cover Crop, traitement phytosanitaire, désherbage chimique, etc....) :

$$C3 = \text{Frais des opérations culturales mécanisées}$$

$$\text{Total charges variables} = C1 + C2 + C3$$

4.1.2. Les recettes des exploitations

Elles sont constituées des recettes générées par la vente des céréales ;

$\text{Total recettes} = (\text{Quantité de céréales produites} * \text{Prix de vente de chaque espèce})$

4.1.3. La marge brute et la valeur ajoutée

La marge bénéficiaire est calculée par une simple différence entre les produits et les charges.

Tableau 11: Méthode de calcul de la marge bénéficiaire d'un hectare de cultures maraichères (pomme de terre, oignon et tomate)

Charges	
- Charges d'intrants agricoles	C1
- Charges de main d'œuvre	C2
- Charges de location du matériel agricole	C3
Total charges variables	$C_T = C1 + C2 + C3$
Produits	
Vente des légumes	P= Quantité de légumes produite * Prix de vente
Total produits	P
Marge	$P - C_T$

4.2. Fiche technico économique de la pomme de terre par zone homogène pour la région de Tanger Tétouan Al-Hoceima

Fiche technico-économique											
Filière: pomme de terre											
Région: Tanger Tétouan Alhoceima/zone de plaine de loukkous (gravitaire)											
Opérations	FREQ. %	TRAVAUX				MAIN D'OEUVRE					
		U	Qtité	PU	PT	Qtité		PU	PT (en Dh)		
						U	M.O.F	M.O.S	Dh	M.O.F	M.O.S
Labour moyen	1	Ha	1	300 Dh	300	J.T			70	0	0
Cover crop	1	Ha	2	150 Dh	300	J.T			70	0	0
Epandage fumier	1	Ha			0	J.T		2	70	0	140
Manutention engrais	1	Ha			0	J.T			70	0	0
Hersage	1	Ha			0	J.T			70	0	0
Epandage engrais	1	Ha			0	J.T	1	1	70	70	70
Billonage	1	Ha	1	150 Dh	150	J.T			70	0	0
Semis-Plantation	1	Ha			0	J.T	4	5	70	280	350
Recouvrement	1	Ha			0	J.T			70	0	0
Binage-Démariage	1	Ha			0	J.T	5	3	70	350	210
Buttage	1	Ha			0	J.T			70	0	0
Confection cuvettes	1	Ha			0	J.T			70	0	0
Traitement. mécan.	1	Ha			0	J.T			70	0	0
Desherbage chimique	1	Ha			0	J.T			70	0	0
Traitement phyto	1	Ha			0	J.T	2	4	70	140	280
Epandage engr. couv.	1	Ha			0	J.T	1	3	70	70	210
Confection seguia	1	Ha			0	J.T			70	0	0
Irrigation	1	Ha			0	J.T	2	5	70	140	350
Récolte	1	Ha			0	J.T	12	25	70	840	1750
Charg. transp. récol	1	Ha			0	J.T			70	0	0
Lutte moineaux	1	Ha			0	J.T			70	0	0
Gardiennage	1	Ha			0	J.T			70	0	0
Bottlage	1	U			0	J.T			70	0	0
Taille	1	Ha			0	J.T			70	0	0
Chaussage-dessaucha.	1	Ha			0	J.T			70	0	0
Système tuteurage	1	Ha			0	J.T			70	0	0
Transport produits	1				0	J.T			70	0	0
Autres	1				0	J.T			70	0	0
Total 1					750	J.T	27	48	35	1890	3360
INTRANTS											
Fumier	1	T	10	80 Dh	800						
Engrais(Unités)	1				0						
14/28/14	1	qx	2,00	260 Dh	520						
Urée 46%	1	qx	2,00	300 Dh	600						
	1				0						
	1				0						
Produits Phyt.											
-Insecticide	1	U	2	200 Dh	400						
-Fongicide	1	U	3	200 Dh	600						
	1				0						
	1				0						
	1				0						
Semences Sel.	1	QI			0						
Semences Loc.	1	QI	16	400 Dh	6400						
Boutures	1				0						
Sacherie	1	U			0						
Caisserie	1	U			0						
Outils récolte	1	U			0						
Transport intrants	1				0						
Autres	1				0						
Total 2					9320						
Eau d'irrigation	1	M3	6000	0,5	3000						
Ammortissement	1	Ha			0						
P.directe	1	Ha			0						
Total 3					3000						
Total partiel					16430						
V.Loc.terre	1	An	1	5000	5000						
Total 4					5000						
TOT.GENERAL					21430						
Coût et revenu de la culture de pomme de terre par hectare											
Nature	Productions			Charges		Revenu					
	Quantité (qx)	Prix (Dh/qx)	Montant (DH)	Nature	Montant (DH)	Type	Montant (DH)				
pomme de terre	400	130,00	52000	Am. Ch.f.	0	Prd.Brut	52000				
				Intrants	9320	Marge brute	35570				
				M.O.Sal.	3360	Marge nette	30570				
				M.O.Fam.	1890	Val.ajt brute	38930				

Fiche technico-économique											
Filière: pomme de terre											
Région: Tanger Tétouan Alhoceima/zone de plaine de loukkous (goutte à goutte)											
Opérations	FREQ. %	TRAVAUX				MAIN D'OEUVRE					
		U	Qtité	PU	PT	U	Qtité		PU	PT (en Dh)	
						M.O.F	M.O.S	Dh	M.O.F	M.O.S	
Labour moyen	1	Ha	1	300 Dh	300	J.T			70	0	0
Cover crop	1	Ha	2	150 Dh	300	J.T			70	0	0
Epandage fumier	1	Ha			0	J.T		2	70	0	140
Manutention engrais	1	Ha			0	J.T			70	0	0
Hersage	1	Ha			0	J.T			70	0	0
Epandage engrais	1	Ha			0	J.T	1	1	70	70	70
Billonage	1	Ha	1	150 Dh	150	J.T			70	0	0
Semis-Plantation	1	Ha			0	J.T	4	5	70	280	350
Recouvrement	1	Ha			0	J.T			70	0	0
Binage-Démariage	1	Ha			0	J.T	5	3	70	350	210
Buttage	1	Ha			0	J.T			70	0	0
Confection cuvettes	1	Ha			0	J.T			70	0	0
Traitemt. mécan.	1	Ha			0	J.T			70	0	0
Desherbage chimique	1	Ha			0	J.T			70	0	0
Traitement phyto	1	Ha			0	J.T	2	4	70	140	280
Epandage engr. couv.	1	Ha			0	J.T	1	3	70	70	210
Confection segua	1	Ha			0	J.T			70	0	0
Irrigation	1	Ha			0	J.T	2	5	70	140	350
Récolte	1	Ha			0	J.T	12	25	70	840	1750
Charg. transp. récol	1	Ha			0	J.T			70	0	0
Lutte moineaux	1	Ha			0	J.T			70	0	0
Gardiennage	1	Ha			0	J.T			70	0	0
Bottlage	1	U			0	J.T			70	0	0
Taille	1	Ha			0	J.T			70	0	0
Chaussage-dessaucha.	1	Ha			0	J.T			70	0	0
Système tuteurage	1	Ha			0	J.T			70	0	0
Transport produits	1				0	J.T			70	0	0
Autres	1				0	J.T			70	0	0
Total 1					750	J.T	27	48	35	1890	3360
INTRANTS											
Fumier	1	T	10	80 Dh	800						
Engrais(Unités)	1				0						
14/28/14	1	qx	2,00	260 Dh	520						
Urée 46%	1	qx	2,00	300 Dh	600						
	1				0						
	1				0						
Produits Phyt.											
-Insecticide	1	U	2	200 Dh	400						
-Fongicide	1	U	3	200 Dh	600						
	1				0						
	1				0						
	1				0						
	1				0						
Semences Sel.	1	QI			0						
Semences Loc.	1	QI	16	400 Dh	6400						
Boutures	1				0						
Sacherie	1	U			0						
Caisserie	1	U			0						
Outils récolte	1	U			0						
Transport intrants	1				0						
Autres	1				0						
Total 2					9320						
Eau d'irrigation	1	M3	4000	0,5	2000						
Amortissement	1	Ha	3000	1	3000						
P.directe	1	Ha			0						
Total 3					5000						
Total partiel					18430						
V.Loc.terre	1	An	1	5000	5000						
Total 4					5000						
TOT.GENERAL					23430						
Coût et revenu de la culture de pomme de terre par hectare											
Nature	Productions			Charges		Revenu					
	Quantité (qx)	Prix (Dh/qx)	Montant (DH)	Nature	Montant (DH)	Type	Montant (DH)				
pomme de terre	500	130,00	65000	Am. Ch.f.	0	Prd.Brut	65000				
				Intrants	9320	Marge brute	46570				
				M.O.Sal.	3360	Marge nette	41570				
				M.O.Fam.	1890	Val.ajt brute	49930				

Fiche technico-économique											
Filière: pomme de terre											
Région: Tanger Tétouan Alhoceima/zone rifaine (gravitaire)											
Opérations	FREQ. %	TRAVAUX				MAIN D'OEUVRE					
		U	Qtité	PU	PT	U	Qtité		PU	PT (en Dh)	
						M.O.F	M.O.S		Dh	M.O.F	M.O.S
Labour moyen	1	Ha	1	350 Dh	350	J.T			70	0	0
Cover crop	1	Ha	2	180 Dh	360	J.T			70	0	0
Epandage fumier	1	Ha			0	J.T		2	70	0	140
Manutention engrais	1	Ha			0	J.T			70	0	0
Hersage	1	Ha			0	J.T			70	0	0
Epandage engrais	1	Ha			0	J.T	1	1	70	70	70
Billonage	1	Ha	1	160 Dh	160	J.T			70	0	0
Semis-Plantation	1	Ha			0	J.T	4	5	70	280	350
Recouvrement	1	Ha			0	J.T			70	0	0
Binage-Démariage	1	Ha			0	J.T	5	3	70	350	210
Buttage	1	Ha			0	J.T			70	0	0
Confection cuvettes	1	Ha			0	J.T			70	0	0
Traitement. mécan.	1	Ha			0	J.T			70	0	0
Desherbage chimique	1	Ha			0	J.T			70	0	0
Traitement phyto	1	Ha			0	J.T	2	4	70	140	280
Epandage engr. couv.	1	Ha			0	J.T	1	3	70	70	210
Confection seguaia	1	Ha			0	J.T			70	0	0
Irrigation	1	Ha			0	J.T	2	5	70	140	350
Récolte	1	Ha			0	J.T	12	25	70	840	1750
Charg. transp. récol	1	Ha			0	J.T			70	0	0
Lutte moineaux	1	Ha			0	J.T			70	0	0
Gardiennage	1	Ha			0	J.T			70	0	0
Bottlage	1	U			0	J.T			70	0	0
Taille	1	Ha			0	J.T			70	0	0
Chaussage-dessaucha.	1	Ha			0	J.T			70	0	0
Système tuteurage	1	Ha			0	J.T			70	0	0
Transport produits	1				0	J.T			70	0	0
Autres	1				0	J.T			70	0	0
Total 1					870	J.T	27	48	35	1890	3360
INTRANTS											
Fumier	1	T	10	80 Dh	800						
Engrais(Unités)	1				0						
14/28/14	1	qx	2,00	260 Dh	520						
Urée 46%	1	qx	2,00	300 Dh	600						
	1				0						
	1				0						
Produits Phyt.											
-Insecticide	1	U	2	250 Dh	500						
-Fongicide	1	U	3	300 Dh	900						
	1				0						
	1				0						
	1				0						
	1				0						
Semences Sel.	1	QI			0						
Semences Loc.	1	QI	16	400 Dh	6400						
Boutures	1				0						
Sacherie	1	U			0						
Caisserie	1	U			0						
Outils récolte	1	U			0						
Transport intrants	1				0						
Autres	1				0						
Total 2					9720						
Eau d'irrigation	1	M3	6000	0,5	3000						
Ammortissement	1	Ha			0						
P.directe	1	Ha			0						
Total 3					3000						
Total partiel					16950						
V.Loc.terre	1	mois	12	4 000 Dh	4000						
F.Financiers	1	mois	9		0						
Total 4					4000						
TOT.GENERAL					20950						
Coût et revenu de la culture de pomme de terre par hectare											
Nature	Productions			Charges		Revenu					
	Quantité (qx)	Prix (Dh/qx)	Montant (DH)	Nature	Montant (DH)	Type	Montant (DH)				
pomme de terre	300	135,00	40500	Am. Ch.f.	0	Prd.Brut	40500				
				Intrants	9720	Marge brute	23550				
				M.O.Sal.	3360	Marge nette	19550				
				M.O.Fam.	1890	Val.ajt brute	26910				

Fiche technico-économique											
Filière: pomme de terre											
Région: Tanger Tétouan Alhoceïma/zone rifaine (goutte à goutte)											
Opérations	FREQ. %	TRAVAUX				MAIN D'OEUVRE					
		U	Qtité	PU	PT	U	Qtité		PU	PT (en Dh)	
						M.O.F	M.O.S	Dh	M.O.F	M.O.S	
Labour moyen	1	Ha	1	350 Dh	350	J.T			70	0	0
Cover crop	1	Ha	2	180 Dh	360	J.T			70	0	0
Epandage fumier	1	Ha				J.T		2	70	0	140
Manutention engrais	1	Ha			0	J.T			70	0	0
Hersage	1	Ha			0	J.T			70	0	0
Epandage engrais	1	Ha			0	J.T	1	1	70	70	70
Billonage	1	Ha	1	160 Dh	160	J.T			70	0	0
Semis-Plantation	1	Ha			0	J.T	4	5	70	280	350
Recouvrement	1	Ha			0	J.T			70	0	0
Binage-Démariage	1	Ha			0	J.T	5	3	70	350	210
Buttage	1	Ha			0	J.T			70	0	0
Confection cuvettes	1	Ha			0	J.T			70	0	0
Traitement. mécan.	1	Ha			0	J.T			70	0	0
Desherbage chimique	1	Ha			0	J.T			70	0	0
Traitement phyto	1	Ha			0	J.T	2	4	70	140	280
Epandage engr. couv.	1	Ha			0	J.T	1	3	70	70	210
Confection seguia	1	Ha			0	J.T			70	0	0
Irrigation	1	Ha			0	J.T	2	5	70	140	350
Récolte	1	Ha			0	J.T	12	25	70	840	1750
Charg. transp. récol	1	Ha			0	J.T			70	0	0
Lutte moineaux	1	Ha			0	J.T			70	0	0
Gardiennage	1	Ha			0	J.T			70	0	0
Bottlage	1	U			0	J.T			70	0	0
Taille	1	Ha			0	J.T			70	0	0
Chaussage-dessaucha.	1	Ha			0	J.T			70	0	0
Système tuteurage	1	Ha			0	J.T			70	0	0
Transport produits	1				0	J.T			70	0	0
Autres	1				0	J.T			70	0	0
Total 1					870	J.T	27	48	35	1890	3360
INTRANTS											
Fumier	1	T	10	80 Dh	800						
Engrais(Unités)	1				0						
14/28/14	1	qx	2,00	260 Dh	520						
Urée 46%	1	qx	2,00	300 Dh	600						
	1				0						
	1				0						
Produits Phyt.											
-Insecticide	1	U	2	250 Dh	500						
-Fongicide	1	U	3	300 Dh	900						
	1				0						
	1				0						
	1				0						
	1				0						
Semences Sel.	1	QI			0						
Semences Loc.	1	QI	16	400 Dh	6400						
Boutures	1				0						
Sacherie	1	U			0						
Caisserie	1	U			0						
Outils récolte	1	U			0						
Transport intrants	1				0						
Autres	1				0						
Total 2					9720						
Eau d'irrigation	1	M3	3000	0,5	1500						
Ammortissement	1	Ha	3000	1	3000						
P.directe	1	Ha			0						
Total 3					4500						
Total partiel					18450						
V.Loc.terre	1	An	1	4 000 Dh	4000						
Total 4					4000						
TOT.GENERAL					22450						
Coût et revenu de la culture de pomme de terre par hectare											
Nature	Productions			Charges		Revenu					
	Quantité (qx)	Prix (Dh/qx)	Montant (DH)	Nature	Montant (DH)	Type	Montant (DH)				
pomme de terre	400	135,00	54000	Am. Ch.f.	3000	Prd.Brut	54000				
				Intrants	9720	Marge brute	35550				
				M.O.Sal.	3360	Marge nette	31550				
				M.O.Fam.	1890	Val.aj.t brute	38910				

4.3. Fiche technico économique de l'oignon par zone homogène pour la région de Tanger Tétouan Al Hoceima

Elaboration des référentiels techniques et technico-économiques

Fiche technico-économique											
Filière: OIGNON											
Région: tanger Tétouan AL hoceima/zone homogène rifaine											
Opérations	FREQ.	TRAVAUX				MAIN D'OEUVRE					
		U	Qtité	PU	PT	U	Qtité		PU	PT (en Dh)	
	%						M.O.F	M.O.S	Dh	M.O.F	M.O.S
Labour moyen	1	Ha	1	350 Dh	350	J.T			50	0	0
Cover crop	1	Ha	2	150 Dh	300	J.T			50	0	0
Epannage fumier	1	Ha			0	J.T		2	50	0	100
Manutention engrais	1	Ha			0	J.T			50	0	0
Hersage	1	Ha			0	J.T			50	0	0
Epannage engrais	1	Ha			0	J.T	1	1	50	50	50
Billonage	1	Ha	1	120 Dh	120	J.T			50	0	0
Semis-Plantation	1	Ha			0	J.T	5	15	50	250	750
Recouvrement	1	Ha			0	J.T			50	0	0
Binage-Démariage	1	Ha	1	180 Dh	180	J.T	5	5	50	250	250
Buttage	1	Ha			0	J.T			50	0	0
Confection cuvettes	1	Ha			0	J.T			50	0	0
Traitement. mécan.	1	Ha			0	J.T			50	0	0
Desherbage chimique	1	Ha			0	J.T			50	0	0
Traitement phyto	1	Ha			0	J.T	2	2	50	100	100
Epannage engr. couv.	1	Ha			0	J.T	1	5	50	50	250
Confection segua	1	Ha			0	J.T			50	0	0
Irrigation	1	Ha			0	J.T	4	3	50	200	150
Récolte	1	Ha			0	J.T	10	16	50	500	800
Charg. transp. récol	1	Ha			0	J.T			50	0	0
Lutte moineaux	1	Ha			0	J.T			50	0	0
Gardiennage	1	Ha			0	J.T			50	0	0
Bottlage	1	U			0	J.T			50	0	0
Taille	1	Ha			0	J.T			50	0	0
Transport produits	1				0	J.T			50	0	0
Autres	1				0	J.T			50	0	0
Total 1					950	J.T	28	49	35	1400	2450
INTRANTS											
Fumier	1	T	8	80 Dh	640						
Engrais(Unités)	1				0						
14/28/14	1	qx	3,00	270 Dh	810						
Urée 46%	1	qx	2,00	320 Dh	640						
Produits Phyt.					0						
-Insecticide	1	U	2	200	400						
-Fongicide	1	U	3	200	600						
	1				0						
Semences Sel.	1	QI	0,075	35 000 Dh	2 625						
Semences Loc.	1	QI			0						
Boutures	1				0						
Sacherie	1	U			0						
Caisserie	1	U			0						
Outils récolte	1	U			0						
Transport intrants	1				0						
Autres	1				0						
Total 2					5715						
Eau d'irrigation	1	M3	2000	0,5	1000						
Ammortissement	1	Ha	3000		0						
P.directe	1	Ha			0						
Total 3					1000						
Total partiel					10115						
V.Loc.terre	1	An	1	5000	5000						
Total 4					5000						
TOT.GENERAL					15115						
Coût et revenu de la culture de l'oignon par hectare											
Nature	Productions			Charges		Revenu					
	Quantité (qx)	Prix (Dh/qx)	Montant (DH)	Nature	Montant (DH)	Type	Montant (DH)				
oignon	200	130,00	26000	Am. Ch.f.	0	Prd.Brut	26000				
				Intrants	5715	Marge brute	15885				
				M.O.Sal.	2450	Marge nette	10885				
				M.O.Fam.	1400	Val.ajt brute	18335				

Elaboration des référentiels techniques et technico-économiques

Fiche technico-économique											
Filière: OIGNON											
Région: tanger Tétouan AL hoceïma/zone homogène tangerois											
Opérations	FREQ. %	TRAVAUX				MAIN D'OEUVRE					
		U	Qtité	PU	PT	U	Qtité		PU Dh	PT (en Dh)	
							M.O.F	M.O.S		M.O.F	M.O.S
Labour moyen	1	Ha	1	350 Dh	350	J.T			50	0	0
Cover crop	1	Ha	2	150 Dh	300	J.T			50	0	0
Epannage fumier	1	Ha			0	J.T		2	50	0	100
Manutention engrais	1	Ha			0	J.T			50	0	0
Hersage	1	Ha			0	J.T			50	0	0
Epannage engrais	1	Ha			0	J.T	1	1	50	50	50
Billonage	1	Ha	1	150 Dh	150	J.T			50	0	0
Semis-Plantation	1	Ha			0	J.T	5	15	50	250	750
Recouvrement	1	Ha			0	J.T			50	0	0
Binage-Démariage	1	Ha	1	150 Dh	150	J.T	5	5	50	250	250
Buttage	1	Ha			0	J.T			50	0	0
Confection cuvettes	1	Ha			0	J.T			50	0	0
Traitement. mécan.	1	Ha			0	J.T			50	0	0
Desherbage chimique	1	Ha			0	J.T			50	0	0
Traitement phyto	1	Ha			0	J.T	2	2	50	100	100
Epannage engr. couv.	1	Ha			0	J.T	1	5	50	50	250
Confection segua	1	Ha			0	J.T			50	0	0
Irrigation	1	Ha			0	J.T	4	3	50	200	150
Récolte	1	Ha			0	J.T	10	16	50	500	800
Charg. transp. récol	1	Ha			0	J.T			50	0	0
Lutte moineaux	1	Ha			0	J.T			50	0	0
Gardiennage	1	Ha			0	J.T			50	0	0
Bottlage	1	U			0	J.T			50	0	0
Taille	1	Ha			0	J.T			50	0	0
Chaussage-dessaucha.	1	Ha			0	J.T			50	0	0
Système tuteurage	1	Ha			0	J.T			50	0	0
Transport produits	1				0	J.T			50	0	0
Autres	1				0	J.T			50	0	0
Total 1					950	J.T	28	49	35	1400	2450
INTRANTS											
Fumier	1	T	8	80 Dh	640						
Engrais(Unités)	1				0						
14/28/14	1	qx	3,00	280 Dh	840						
Urée 46%	1	qx	2,00	320 Dh	640						
	1				0						
	1				0						
Produits Phyt.											
-Insecticide	1	U	2	250 Dh	500						
-Fongicide	1	U	3	250 Dh	750						
	1				0						
	1				0						
	1				0						
	1				0						
Semences Sel.	1	Ql	0,075	35 000 Dh	2 625						
Semences Loc.	1	Ql			0						
Boutures	1				0						
Sacherie	1	U			0						
Caisserie	1	U			0						
Outils récolte	1	U			0						
Transport intrants	1				0						
Autres	1				0						
Total 2					5995						
Eau d'irrigation	1	M3	2000	0,55	1100						
Ammortissement	1	Ha			0						
P.directe	1	Ha			0						
Total 3					1100						
Total partiel					10495						
V.Loc.terre	1	An	1	5000	5000						
Total 4					5000						
TOT.GENERAL					15495						
Coût et revenu de la culture de l'oignon par hectare											
Nature	Productions			Charges		Revenu					
	Quantité (qx)	Prix (Dh/qx)	Montant (DH)	Nature	Montant (DH)	Type	Montant (DH)				
oignon	250	130,00	32500	Am. Ch.f.	0	Prd.Brut	32500				
				Intrants	5995	Marge bru	22005				
				M.O.Sal.	2450	Marge net	17005				
				M.O.Fam.	1400	Val.ajt bru	24455				

Références bibliographiques relatives à la culture de la pomme de terre

- Abbad Andaloussi F., 2016. Les nématodes de la pomme de terre au Maroc In Les ennemis de la culture de pomme de terre au Maroc. INRA Editions 2016. P41-54.
- Achbani E. et al., 2016. Protection phytosanitaire In la culture de pomme de terre au Maroc. INRA Editions 2016. p 71-104.
- Achbani E., 2016. La culture de pomme de terre au Maroc. INRA Editions 2016. pp 163.
- Achbani E., 2016. Les ennemis de la culture de pomme de terre au Maroc. INRA Editions 2016. pp 216.
- Achbani E., 2016. Récolte de la pomme de terre au Maroc. INRA Editions 2016. pp 163.
- Achbani E., 2016. Les maladies fongiques de la pomme de terre au Maroc In Les ennemis de la culture de pomme de terre au Maroc. INRA Editions 2016. P41-54.
- Achbani E., Afechtal M., Ennaji M., 2016. Les maladies virales de la pomme de terre au Maroc In Les ennemis de la culture de pomme de terre au Maroc. INRA Editions 2016. P41-54.
- Achbani E., Hafidi M., 2016. Le mildiou de la pomme de terre au Maroc In Les ennemis de la culture de pomme de terre au Maroc. INRA Editions 2016. p21-40.
- Achbani E., Tahmiza R., 2016. Les maladies bactériennes de la pomme de terre au Maroc In Les ennemis de la culture de pomme de terre au Maroc. INRA Editions 2016. P41-54.
- Chibane A., 1999. Techniques de production de la pomme de terre au Maroc. Transfert de technologie en agriculture. N° 52. Janvier 1999, pp 4.
- Chibane A., 2016. Caractéristiques botaniques, exigences écologiques et itinéraire technique de la pomme de terre In la culture de la pomme de terre au Maroc. INRA-Editions 2016, p15-24.
- Chibane A., 2016. La culture de la pomme de terre au Maroc In la culture de la pomme de terre au Maroc. INRA-Editions 2016, p25-46.
- El Ghazi K., 2011. Analyse de la filière de la pomme de terre dans la région de la Moulouya. Projet de fin d'étude. IAV II.
- El Iraqui AlHoussaini S., 2016. Les insectes de la pomme de terre au Maroc In Les ennemis de la culture de pomme de terre au Maroc. INRA Editions 2016. p21-40.
- ELMAHDAOUI S., 2005. Filière d'exportation de la pomme de terre dans la région de Casablanca Enjeux et Perspectives. Projet de fin d'étude. IAV II. pp 166.
- Hamim A. et Mrabet R., 2016. Fertilisation minérale et organique de la pomme de terre : cas particulier de la zone du Loukkos. In la culture de la pomme de terre au Maroc. INRA-Editions 2016, p49-64.
- Hamal A., Chafik Z., 2016. Adventices et désherbage de la pomme de terre au Maroc In Les ennemis de la culture de pomme de terre au Maroc. INRA Editions 2016. p21-40.
- MOUGOULA I.G., 2005. Contribution à l'amélioration de la production de pomme de terre par pilotage de la fertiligation : cas de Mnasra. Projet de fin d'étude. IAV II. pp165.
- Skiredj A., Elattir H., Elfadl A., 2002. La pomme de terre, la betterave potagère, l'oignon, la carotte. Transfert de technologie en agriculture. N° 98, Novembre. pp4.
- www.agrireseau.net
- www.plantdepommedeterre.org

Références bibliographiques relatives à la culture de l'oignon

- Ajaanid I., 2016. Comment réussir une bonne culture de l'oignon ? consulté sur <http://www.agrimaroc.ma/reussir-une-bonne-culture-de-loignon/>
- Aminatou N. 2001. Etude de l'effet de l'hydrazide maléique, de la température de stockage et de la variété sur la conservation de l'oignon *Allium cepa* L. Mémoire de 3ème Cycle Agronomie. Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Complexe Horticole d'Agadir, Maroc. : 4-15.
- BONNEMORT C., 2008. Ail, oignon, échalote. Fiche technique. Chambre d'agriculture de l'Aude. pp6.
- Collin F. et Brun L., 2004. Produire des semences d'oignon dans un itinéraire agrobiologique. TECN'ITAB semences. FNAMS. pp16.
- Dansette T., 2011. Oignon, récolte, séchage et conservation. Fiches thématiques. Agriculture biologique. Chambre d'agriculture Rhône alpes, pp 4.
- ELALAMI F., 2009. Investigation sur les filières de la pomme de terre et de l'oignon dans la province d'El Hajeb : production et possibilités de valorisation industrielle. Projet de fin d'étude. IAV II. pp172.
- El Atiqy, M. 1996. Effet des prétraitements post-récolte et des conditions de stockage sur la qualité de l'oignon (*Allium cepa* L.) de la variété « rouge locale ». Mémoire 3ème Cycle Industries Agro-Alimentaires. Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Rabat, Maroc. : 52-57.
- El Kacimi, B, 1995. Investigation sur les techniques de culture et de stockage de l'oignon sec (*Allium cepa* L.) (Cas de la région de Meknès). Mémoire de 3ème Cycle Industries Agro-Alimentaires. Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Rabat, Maroc. : 30-35.
- El Yazidi Rachid, 1995. Investigation sur les techniques de culture et de stockage de l'oignon sec (*Allium cepa* L.) (Cas de la région de Meknès). Mémoire de 3ème cycle I.A.A., I.A.V. Hassan II, Rabat, Maroc. : 80-95.
- Hallouin I., 2004. Oignon botte et Oignon de conservation. FICHE CULTURALE OIGNONS. Chambre d'agriculture Rhône Alpes Juin 2014, pp16.
- Gourc D. Payet J-D., Monnier D., 2007. OIGNON Guide pratique Ile de La Réunion. ARMEFLHOR, pp 106.
- Leblanc M., 2002. Le thrips de l'oignon : un insecte difficile à réprimer. Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Canada.
- Leblanc M., 2002. Le thrips de l'oignon : quelques pistes pour accroître l'efficacité des traitements. Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Canada.
- SERRAR M. 2013.conservation traditionnelle de l'oignon à Elhajeb les pertes engendrées et les moyens de les limiter. Agriculture du Maghreb. N°67. Avril 2013. P 154-168.
- Skiredj A., Elattir H., Elfadl A., 2002. La pomme de terre, la betterave potagère, l'oignon, la carotte. Transfert de technologie en agriculture. N° 98, Novembre. pp4.
- <https://seminis.fr/informations/guides-des-maladies/oignons/stem-bulb-nematode/>
- www.e-makane.net
- www.armeفلhor.fr
- www.agro.basf.fr



المكتب الوطني للإستشارة الفلاحية
Office National du Conseil Agricole

Siège : Avenue Mohamed Belarbi Alaoui – Rabat
Adresse postale : B.P : 6672 – Rabat Instituts
Tél : 0537.77.65.13
Fax : 0537.77.92.89
www.onca.gov.ma/

NOVEC

GRUPE CDG

Immeuble NOVEC, Park Technopolis 11 100, Sala El Jadida/ Rabat-Salé
Tél : 0537 576 800
Fax : 0537 566 741
www.novec.ma