



المكتب الوطني للإستشارة الفلاحية
المكتب الوطني للإستشارة الفلاحية
Office National du Conseil Agricole

الصفحة رقم 31/2015/م.و.إف

إعداد المراجع التقنية والتقنية الإقتصادية

المرحلة 3: إعداد المراجع التقنية والتقنو-اقتصادية خاصة بالسلسلة

سلسلة الإجاص



دليل الفلاح

465-N1077-18b

نسخة نهائية

الفهرس

الفهرس	11
1. الأهمية الاقتصادية و مكانة الزراعة	3
2. متطلبات التربة والمناخ الخاصة بالزراعة	3
3. تقنيات انشاء بستان الإجاص	3
3.1. اعداد التربة	3
3.2. الغرس	3
3.3. فترة الغرس	4
3.4. اختيار الأصناف	4
3.5. اختيار حامل الطعم	5
3.6. كثافة الغرس	6
4. التقليم	6
4.1. أعضاء شجرة الإجاص	6
4.2. تقليم التكوين	7
4.3. تقليم الاثمار	9
4.4. ادوات التقليم	10
4.5. التدابير التي يجب اتخاذها عند التقليم	11
5. السقي	11
6. التسميد	12
7. صيانة الأرض و محاربة الأعشاب الضارة	14
7.1. فئات الأعشاب الضارة	14
7.2. المراحل الحساسة لأشجار الإجاص من الأعشاب الضارة	14
7.3. محاربة الأعشاب الضارة	15
8. التلقيح	15
9. أمراض وحشرات شجرة الإجاص	16
10. الجني والتأمين والتخزين	22
10.1. الجني	22
10.2. تخزين الإجاص	22
10.3. تلفيف الإجاص	23

1. الأهمية الاقتصادية و مكانة الزراعة

تنتمي شجرة الإجاص إلى عائلة الورديات. هذه الزراعة موجودة في جميع القارات. وتقدر المساحة المزروعة بمليون هكتار في جميع أنحاء العالم. يبلغ الإنتاج العالمي هو حوالي 20 مليون طن للاستهلاك والتجهيز (عصير، والإجاص منقوع، والإجاص المعلبة والإجاص المجمدة، وأغذية الأطفال). تعتبر فاكهة الإجاص مصدرا للفيتامينات A و B، والفوسفور واليود.

في المغرب، شهدت المساحة المزروعة بأشجار الإجاص انخفاضا بسبب انتشار مرض اللفحة النارية الذي أجبر المزارعين على قلع وحرق الأشجار المصابة.

مناطق الإنتاج الرئيسية هي الأطلس المتوسط والكبير (أزرو - إفران)، سهول سايس (مكناس - فاس) - ميدلت والغرب.

وفي عام 2015، قدرت المساحة بنحو 3400 هكتار والإنتاج ب 46 000 طن للاستهلاك والتصدير.

2. متطلبات التربة والمناخ الخاصة بالزراعة

تنمو شجرة الإجاص في المناطق المناخية التي تبلغ درجة حرارة الشتاء بها أقل من 7 درجات مئوية. وذلك من أجل تلبية متطلباتها من البرد التي تتراوح بين 1200 إلى 1500 ساعة من درجات الحرارة أقل من 7.2 درجة مئوية. خلال السكون، يمكن لشجرة الإجاص ان تتحمل درجات حرارة تصل إلى ناقص 26 درجة مئوية.

تساهم درجات الحرارة بين 21 و 26 درجة مئوية في نجاح عملية التلقيح لأنها تلائم نشاط النحل، بينما تؤدي درجات الحرارة فوق 27 درجة مئوية وأقل من 12 درجة مئوية المصحوبة بانخفاض الرطوبة إلى انخفاض حجم الفاكهة.

لا يؤثر انخفاض درجة الحرارة اثناء فترة نضج الفاكهة بل يساهم في تلوين جيد للفاكهة، الا ان ظهور الضباب و هطول الأمطار خلال هذه الفترة يؤدي الى تناقص لون الثمار او تغيير لونها الى البني.

تتكيف شجرة الإجاص مع مجموعة واسعة من التربة طالما أن هذه الأخيرة تحتفظ بما يكفي من الرطوبة ويتميز بتصريف جيد للمياه، و تنمو شجرة الإجاص بشكل جيد في التربة العميقة، الخصبة، الطينية والغنية بالمواد العضوية.

3. تقنيات انشاء بستان الإجاص

3.1. اعداد التربة

يتم إعداد التربة جيدا في العمق وعلى السطح قبل غرس الأشجار مع تصحيح درجة الحموضة إذا لزم الأمر بالإضافة الى امداد التربة بالعناصر المعدنية التي تنقصها. وإذا لم يتسنى حرق كل القطعة الأرضية المراد غرسها فإننا نكتفي بحرق عميق على طول الخطوط التي ستغرس بها أشجار الإجاص وذلك على شريط يبلغ طوله 1,5 متر.

في حالة وجود الأعشاب الضارة المعمرة ينصح باتباع استراتيجية مكافحة لمدة سنتين وذلك لاستهداف مراحل النمو الحساسة للأعشاب الضارة بالإضافة الى حش هذه الأعشاب قبل أن تعطي البذور.

ويسمح إستعمال الاغطية البلاستيكية بالقضاء على الأعشاب الضارة عن طريق خنقها. و تمكن هذه الأغطية من الحفاظ على رطوبة الأرض ورفع درجة حرارتها. وينصح باستعمال الأغطية البلاستيكية ذات اللون الأسود لأنها تمنع إنبات الأعشاب الضارة حيث تحرمها من أشعة الشمس.

3.2. الغرس

من المستحسن إعداد التربة بواسطة محراث سوسلاج متقاطع حسب اتجاهين عموديين من أجل تعزيز تغلغل المياه والجذور في التربة.

إعداد المراجع التقنية والتقنية الاقتصادية

يتم تنفيذ الزراعة يدويا أو ميكانيكيا، وفق الأبعاد المتناسبة مع جذور الشتلات.

بعد انجاز عمليتي التخطيط ووضع الأوتاد حسب كثافة الغرس المختارة بالأخذ بعين الاعتبار اتجاه الرياح و موضع الشمس، يتم حفر حفرة عمقها 0.70 إلى 1 م في الصيف أو عدة أيام قبل الزراعة.

ومن الضروري استخدام شتلات مختارة خالية من الأمراض تتناسب مع الخصائص المناخية للبستان.

ومن أجل إنجاز عملية الغرس لا بد من القيام بالتدابير الاحترازية التالية:

- ✓ يجب عدم إقتلاع الأشجار من المشتل إلا بعد إعداد الحفرة، عكس ذلك يتم حفر خندق وتغطي الجذور بالتراب ويتم سقي الأشجار بانتظام في انتظار نقلها إلى الأماكن المخصصة لها؛
- ✓ يجب قطع الجذور المكسورة وتوحيد طولها مباشرة قبل غرسها؛
- ✓ يجب إدخال الجذور خلال بضع دقائق في محلول من الميپتالاكسيل أو الفورزيتيل-ألومنيوم وذلك تفاديا للإصابة بمرض تعفن الجذور (الفيتوفتورا)؛
- ✓ يجب وضع تربة جيدة حول الجذور؛
- ✓ يجب ملء ما بقي من الحفرة بالتراب ودك التراب بلطف؛
- ✓ يجب الحفاظ على مكان إلتقاء الصنف وحامل الطعم بشكل واضح خارج الحفرة؛
- ✓ يجب سقي الأشجار مباشرة لتفادي تكون جيوب الريح حول الجذور؛
- ✓ يجب قطع الشتيلة على عيينين إلى ثلاثة عيون إستعدادا لتكوين الشجرة على شكل الكأس

3.3. فترة الغرس

تتم عملية الغرس خلال فترة سكون الشتلات التي تمتد من نونبر إلى مارس مع تجنب فترات الصقيع، هطول الأمطار أو الرياح القوية. ويجب ان تكون جذور الشتلات منتشرة بشكل جيد، وينبغي ان يكون جذع الشتلة مرتفعا عن سطح الارض ولا يتم دفن في التربة.

3.4. اختيار الأصناف

تعتبر اصناف الاجاص اقل من اصناف التفاح. بالمغرب يتم غرس اصناف قليلة تغطي الانتاج الوطني من الاجاص ومن اهمها:







- ❖ الصنف ويليامز الذي ينضج في منتصف غشت و يتميز هذا الصنف بثمار كبيرة ذات لون صفراء؛
- ❖ الصنف دويان دو كوميس ينضج في أكتوبر و يتميز بفاكهته الخضراء الكبيرة.
- ❖ الصنف كونفرونس هو صنف متأخر النضج و يتميز بفواكه خضراء.

اختيار الأصناف الملائمة ضروري من أجل ضمان الانتاجية والريح




- ❖ يجب اختيار الأصناف الملائمة لظروف المناخية بالمنطقة.
- ❖ يجب اختيار الاصناف حسب الطلب عليها بالأسواق من أجل ضمان الربح.

جدول 1: أهم أصناف الإجاص

		
بوري هاردي	كونفرونس	دجيل غيبوط
		
لويز بون	وليام	دوايان دو كوميس

3.5. اختيار حامل الطعم

اختيار حامل الطعم الملائم	
<p>❖ عند اختيار حامل الطعم، يجب الأخذ بعين الاعتبار المعايير الثلاثة التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ الإنسجام بين الصنف وحامل الطعم؛ ✓ المتطلبات من التربة لحامل الطعم؛ ✓ مقاومة الأمراض والحشرات؛ ✓ طريقة تسيير البستان. 	

فإن حاملي الطعم الرئيسية للإجاص هي:

السفرجل : يمكن لحامل الطعم من نوع السفرجل أن يتحمل الاختناق، ولكنه يتكيف بشكل سيء مع التربة الجافة التي تحتوي على الكلس بالإضافة الى انه لا يتحمل المناخ الحار. وينصح باستعمال حامل الطعم B29 لأنه أكثر تكييفاً وتجنب استعمال حاملي الطعم السفرجل انجر و اومس (EMC).

حامل الطعم البذري: يعتبر حامل الطعم البذري أقل حساسية للكلس والجفاف من حامل الطعم السفرجل، و لا يظهر أي مشكل عدم التوافق بينه و بين الأصناف.

إعداد المراجع التقنية والتقنية الاقتصادية

في المغرب، حاملا الطعم الأكثر استخداما هما: حامل الطعم البذري و السفرجل B29. يعطي حامل الطعم البذري قوة كبيرة للصنف ما يشكل عائقا في حالة كثافة الغرس المرتفعة، إلا ان هذا الحمل سليم من امراض فيروسية و يتوافق مع اصناف الإجاص. يبرز السفرجل B29 بنشاطه و نموه السريع بالإضافة الى توافقه الجيد مع الصنف ويلبازم

3.6. كثافة الغرس

إن نظام الغرس يأخذ بعين الاعتبار الكثافة وشكل الأشجار والتي هي نتاج العلاقة بين الصنف وحامل الطعم وخصوبة التربة إضافة إلى استفادة الموقع من أشعة الشمس. ويمكن التمييز بين عدة أنظمة للغرس كما يوضح الجدول الموالي:

جدول 2: أنظمة الغرس حسب الكثافة

النظام	عدد الأشجار في الهكتار
بستان تقليدي	150-80
بستان شبه تقليدي	400-200
بستان شبه كثيف	800-500
بستان كثيف	01500-100
بستان عالي الكثافة	ما يفوق 1500

التباعد الذي كان معمولا به هو 5*5 م (400 شجرة/هكتار) ومع مرور الوقت بدأ الفلاحون يكتفون الأغراس حتى وصلوا إلى ما بين 1000 و 1250 شجرة/هكتار بل وفاقوها أحيانا. ولكن المشاكل التي تظهر عند كبر هذه الغراس هو التلاقي فيما بينها حاجبة الشمس عن مساحة هامة من البستان. وعليه عند اختيار الكثافة يجب التفكير في الحصول على التوازن بين قوة الشجرة والإثمار.

كثافة الغرس
❖ اختيار كثافة الغرس الملائمة لتجنب الدخول غير الكافي للضوء والمنافسة الكبيرة بين الأشجار فيما يخص العناصر المغذية والماء مما يؤدي إلى ثمار ذات أحجام صغيرة وذات لون شاحب، و للحد من الأمراض والحشرات التي تصيب الأشجار

4. التقليم










تسمح عملية التقليم بالحفاظ على شكل الشجرة المتناغم بالإضافة الى تهويتها، و تهدف هذه العملية الى إزالة الأغصان الميتة، و الأغصان التي تتقاطع فيما بينها، والى قطع الأغصان الطويلة جدا البعيدة عن شكل الشجرة.

و تساهم هذه التقنية في الحد من التنافس بين الأغصان الفرعية و الجذع الرئيسي.

4.1. أعضاء شجرة الإجاص

قبل تقليم أشجار الإجاص، من المهم التعرف على مختلف أعضاء شجرة الإجاص. يقدم الجدول التالي وصف لمختلف براعم وأغصان شجرة الإجاص :

جدول 3: اعضاء شجرة الإجاص

		
غصن الخشب	عسلوج	عين خشب
		
غسلوج متوج	برعم زهري	غملوج
		
كيس الثمرة	غصن الحمل	خوط

4.2. تقليم التكوين


يتم القيام به في الأعوام الأولى التي تلي عملية الغرس ويهدف إلى تكوين الشجرة وإعطاء شكل لها. ومن بين الأشكال نذكر الكأس و المحور المركزي.

• الشكل الكأسي

تتكون الشجرة من جذع رئيسي متين من 50 إلى 70 سم وحوله تتوزع الأغصان الرئيسية (عموما من 3 إلى 4). وتأخذ الشجرة شكلا مستديرا ومجوفاً، وهو شكل سهل التسيير.

السنة الأولى:

بعد الغرس يتم تقليم الساق الرئيسي على 50 إلى 70 سنتيم. الأربعة فروع المتواجدة تحت نقطة التقليم يتم قطعها على عيينين إلى ثلاثة عيون. وما بقي يتم قطعه بالكامل. وفي فصل الصيف يتم اختيار الأغصان الرئيسية المستقبلية حيث تكون موزعة بشكل جيد حول الجذع ولا يجب أن تنطلق من نفس النقطة تجنبا للكسور



صورة 1: مراحل التقليم الكأسي

السنة الثانية:

يتم اختيار الأغصان ويتم تقليمها على 30 إلى 50 سم حسب حجم كل واحدة منها ويتم التخلص من الباقي. وفي فصل الصيف يتم اختيار الأغصان الثانوية ويتم توجيهها خارج الأغصان الأم ويتم تقليم الباقي أو إزالتها.

السنة الثالثة:

يتم الاحتفاظ بالأصناف ما عدى إذا تعلق الأمر بتقوية محتملة. وفيما يخص الأغصان الثانوية فيتم تقليمها على 40 إلى 50 سم. ونقوم بالتخلص من الأغصان غير الجانبية والأغصان الزائدة. كما يتم إزالة الأغصان ذت الإتجاه العمودي "سارقي المياه" وكذا البراعم من داخل الشجرة.

• المحور الرئيسي


تتكون الشجرة من جذع محوري موجه إلى الأعلى وتكون برفقته أغصان مدعمة بركائز في الغالب ومتواجدة بشكل منتظم على المحور. ويجب أن تكون زوايا الإدراج فوق 45 درجة.

السنة الأولى:

يحتفظ بالمحور ليمتد إلى الأعلى ويتم التخلص من كافة الأغصان ذات الزوايا التي تقل عن 45 درجة. في حين يتم تقليم الأغصان التي لها زوايا تفوق 45 درجة على عيين إلى 3 عيون ودائما على عين خارجية.

السنة الثانية:

يتم إعفاء الثلث الأعلى من الجذع ويقلم على عين ذات نمو جيد في حالة الضعف. وفيما يخص الأغصان الجانبية المحتفظ بها فتقلم على علو 30 إلى 40 سنتم ويتم التخلص من باقي الأغصان. وخلال نمو الشجرة نقوم بإسناد الأغصان إلى الركائز ونزيل البراعم غير المرغوب فيها



صورة 2 : مراحل تقليم المحور

السنة الثالثة:


نستمر في إعفاء الثلث الأعلى من الجذع ونزيل الأغصان الكثيرة وخاصة تلك التي لها زوايا مغلقة. وعلى باقي الشجرة نبدأ في إنجاز تقليم الإثمار.

4.3. تقليم الإثمار

تهدف هذه العملية إلى:

- ✓ الحث على ظهور أغصان حاملة للثمار؛
- ✓ التخلص من الأغصان اليابسة وكثرة الثمار؛
- ✓ تمكين الشجرة من الاستفادة من كمية كافية من الهواء والشمس؛
- ✓ خلق توازن بين نمو الشجرة وإنتاجها

يمكن أن يكون هذا التقليم طويلاً أو قصيراً. بالنسبة للتقليم الطويل، فإنه يسمح بالاقتماد في اليد العاملة، يساهم في الإثمار السريع و في خفض حجم الشجرة. أما التقليم الصغير، فهو يعتمد على القيام بقطع متكرر للأغصان من أجل الحصول على أغصان فرعية صلبة.



صورة 3: التقليم القصير

تلعب عملية التقليم دورا حاسما في تحسين الانتاج



4.4. ادوات التقليم

للقيام بعملية التقليم على أفضل وجه يجب إستعمال أدوات حادة وخالية من الصدأ. فبعد الإستعمال ينصح بإمرار قطعة ثوب تحتوي على زيت على الشفرات.

ومن بين الأدوات نذكر المقص ومقص القوة والمنتشار والسلايم وماء جافيل والمعجون لانم الجروح.



صورة 4: ادوات التقليم

من أجل تفادي انتقال الأمراض



❖ لا بد من تحسيس العمال بضرورة تعقيم المعدات (المقص ومقص القوة والفأس) خلال عملية التقليم لتفادي انتقال الأمراض من شجرة لأخرى.


4.5. التدابير التي يجب اتخاذها عند التقليم

إعداد شجرة قبل التقليم:

- إزالة كل الخشب الميت من الشجرة عن طريق قطعها باستخدام مقصات التقليم أو القواطع.
- إزالة الأغصان التالفة والمريضة و حرقها.
- إذا كانت هناك ثمار جافة معلقة على الاغصان، فيجب بإزالتها.

خلال تنفيذ عملية التقليم

إذا كنت ترغب في إزالة غصن من القاعدة، يجب ترك هامش صغير من أجل ان يتعافى مكان القطع.



صورة 5: الزاوية الصحيحة لقطع الأغصان

- إذا كنت ترغب في قطع الغصن فوق البرعم فقط، يجب ترك 0.5 سم فوق البرعم.
- يجب الحرص على استخدام مقص التقليم الحاد حتى لا تضر الأنسجة النباتية وبالتالي تعزيز انتشار الفطريات.
- المقلم أو المقلم مع اثنين من اليدين، ويمكن قطع الخشب أكبر مع المقلم.
- وضع حافة القطع من المقصات على جانب جزء من الغصين للحفاظ عليها.

5. السقي

تقدر احتياجات شجرة الإاجاص من الماء ب 725 مم، ويجب سقي اشجار الإاجاص في الفترة ما بين ماي و اكتوبر خاصة ما بين شهري يونيو و غشت حيث تنزامن هذه الفترة مع فترة الذروة.

يتم حساب كمية السقي بواسطة طريقة الحصيلة المائية، و تهدف هذه الطريقة الى الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب على المياه. ويتجلى العرض في مساهمة التربة، وكمية الأمطار، والرّي، والتصاعدات الشعرية. في حين أن الطلب يتجلى في درجة التبخر الفعلي للمياه من الأشجار (وربما من الأعشاب) التي يجب أن تضاف إليها الخسائر عن طريق التدفق والجريان السطحي.

لحساب الحصيلة المائية يجب الأخذ في الحسبان درجة التبخر المحتمل، واحتياطي الماء بالتربة المتاح بسهولة وعمر الأشجار. ويمكن حساب هذه الحصيلة أسبوعيا باعتماد معامل زراعي من 0.8 إلى 0.9 لبستان به اشجار مثمرة.

إعداد المراجع التقنية والتقنية الاقتصادية

يجب أن يتم اختيار نظام الري قبل الزراعة، قد يكون عن طريق السقي السطحي، الغمر، الرش أو بالتنقيط. وتتيح السيطرة على الري ونظم الري الحالية إمكانية تقدير المساهمات.

الاحتياطات الواجب اتخاذها خلال عملية السقي



- ❖ في بساتين الإجاز، يمكن أن يؤدي الإجهاد المائي خلال المراحل الحرجة إلى سقوط أوراق، وانخفاض الغلة وانخفاض الدخل، وخاصة خلال مراحل: الأزهار، عقد الثمار، نمو الثمار، وأيضا خلال نهاية مرحلة نمو الثمار .
- ❖ يجب الحذر من المبالغة في الري حماية للأشجار من الإصابة بالاصفرار والتصمغ وتعفن الجذور وموتها.
- ❖ إيقاف الري خلال فترة الإزهار وبداية عقد الثمار
- ❖ استعمال تقنية الري بالتنقيط من أجل اقتصاد مياه الري

6. التسميد

أثناء إعداد التربة، من الضروري امدادها ب 50 إلى 60 طن / هكتار من السماد العضوي، ب 300 إلى 400 وحدة / هكتار من الفوسفور على شكل سوبيرفوسفات و ب 300 إلى 400 وحدة / هكتار من البوتاسيوم على شكل كبريتات البوتاس أو كبريتات مزدوجة أفضل من البوتاس.

يجب أن توفر للأشجار المثمرة كمية 20 إلى 25 طن / هكتار من السماد العضوي و 120 وحدة/هكتار من الأزوت مقسمة على 3/1 في شكل نترات الأمونيوم في مرحلة ظهور البراعم، و 3/1 على شكل نترات في مرحلة الإزهار و 3/1 على شكل النترات في مرحلة نمو الثمار. وهناك حاجة إلى 50-100 وحدة / هكتار من على شكل P205 سوبر فوسفات في فصل الشتاء لمنع اصفرار الأوراق وتغيير لون الأوردة الورقية.

تعتمد كمية البوتاسيوم على نوعية التربة، وخاصة نسبة الطين التي تحتوي عليها. فمن الأفضل اضافة البوتاسيوم على شكل كبريتات البوتاس. في التربة الرملية: يجب اضافة 50-75 وحدة/هكتار من K20، اما بالنسبة لتربة الطينية فيجب اضافة 150 وحدة/هكتار.

بالنسبة للمغذيات الدقيقة، وخاصة البورون والمغنيسيوم، فمن الأفضل أن يتم امداد الأشجار بها عن طريق رش الأوراق بمحلول يحتوي على تركيز منخفض (0.5 كجم / هل من الماء) من هذه العناصر مذابة في الماء.







الاحتياطات الواجب اتخاذها خلال عملية التسميد



- ❖ يجب اجراء تحليل التربة لمعرفة نسبة العناصر المعدنية وذلك من اجل تحديد كمية الأسمدة التي يجب امداد اشجار الإجاز بها.
- ❖ يجب أن يترافق التحليل الورقي مع تحليل التربة خاصة من اجل تحديد نقص العناصر الصغرى.
- ❖ عقلنة استعمال الأسمدة من أجل الحفاظ على التربة.

يبين الجدول التالي اهم الاعراض التي تصاب بها شجرة الإجاز عند نقص احد العناصر المغذية:

جدول 4: اعراض نقص العناصر المغذية عند شجرة الإجاص

	
نقص الأزوت	نقص البوتاسيوم
	
نقص الفوسفور	نقص المغنيسيوم
	
نقص الكالسيوم	نقص البور

	
<p>نقص الزنك</p>	<p>نقص الحديد</p>

7. صيانة الأرض و محاربة الأعشاب الضارة

7.1. فئات الأعشاب الضارة

تنقسم انواع الأعشاب الضارة الى ثلاثة انواع السنوية والأعشاب التي تعيش سنتين والأعشاب المعمرة.

➤ الأعشاب الضارة السنوية

هي التي تنبت وتزهر وتعطي البذور خلال السنة .

➤ الأعشاب الضارة التي تعيش سنتين

هذه النباتات لديها دورة لمدة عامين، أي أنها تنتج أوراق في السنة الأولى والزهور في السنة الثانية.

تتنافس الأعشاب السنوية والسنوية على المغذيات والمياه مع الأشجار التي تنمو حولها. بعد الازهار، تموت هذه النباتات، ولكن بذورها يتم تخزينها في التربة، يمكن أن تستمر في الإضرار أشجار الإاجاص لعدة سنوات.

➤ الأعشاب الضارة المعمرة

هذه النباتات تعيش لسنوات عديدة، وعادة ما تنتشر في التربة من قبل نظام الجذور المختلف، ويمكن لبعضها ان تتكاثر عن طريق البذور. وعادة ما تزهر مرة واحدة في السنة و تنتشر في البستان، عن طريق تمتد جذورها وانتاج البذور التي تقع على الأرض. يمكن أن تتنافس النباتات المعمرة مع اشجار الإاجاص، خاصة إذا كانت مجتمعة بكثافة حول الاشجار.

7.2. المراحل الحساسة لأشجار الإاجاص من الأعشاب الضارة

فترة الحساسية العالية لأشجار الإاجاص من الأعشاب الضارة تغطي الأشهر الثلاثة الأولى بعد الغرس. بالنسبة للشجرة المثمرة، تظهر الآثار السلبية للأعشاب الضارة بين ظهور البراعم ومرحلة تشكيل البرعم النهائي، أي. من الربيع حتى بداية يوليو. وتتطابق هذه الفترة مع أربع مراحل قياسية:

- ✓ الإزهار؛
- ✓ عقد الثمار؛
- ✓ نمو الثمار؛
- ✓ بداية تكون براعم الإزهار.

7.3. محاربة الأعشاب الضارة

تتجلى صيانة الأرض في تنفيذ مجموعة من التقنيات التي تهدف إلى الحفاظ على التربة في حالة جيدة بعد الزراعة، من أجل تحسين عمل الجذور. يمكن أن نقوم بهذه العملية عن طريق اعداد التربة ميكانيكيا على الطبقة السطحية، أو عن طريق مكافحة الأعشاب كيميائيا، أو بتغطية الأرض بالأغطية البلاستيكية.. وتهدف كل هذه التقنيات إلى القضاء على الأعشاب الضارة والحد من نسبة تبخر المياه.

في بساتين الاجاص، تستعمل مبيدات الأعشاب للسيطرة على الأعشاب الضارة. يعتبر حش الأعشاب يدويا او ميكانيكيا من اهم الطرق الفعالة أخرى للقضاء على الأعشاب الضارة، وخاصة خلال السنة التي تمت بها عملية غرس الأشجار.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض المزارعين يقومون بحش العشب من أجل تغذية مواشيهم.

تساعد مبيدات الأعشاب المسجلة على التخلص من الأعشاب الضارة وينصح باستعمال مبيدات الأعشاب التي توجد في دليل وقايات النباتات المعتمد من طرف مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، و بالنسبة للمبيدات التي تستعمل في بساتين الاجاص نجد المبيدات التي تحتوي على المادة أوكساديازون (فيستفال) أو باراكات (اومنيكات)

يجب احترام تعليمات استخدام مبيد الأعشاب و الكميات الموصى بها. كما يجب تناوب العناصر النشطة لمحاربة أكثر عدد ممكن من الأنواع.



8. التلقيح

تعتبر أصناف أشجار الاجاص غير متوافقة ذاتيا لحصول التلقيح، أي أن حدوث التلقيح يتم عن طريق التلقيح المتقاطع بين صنفين مطلوب لإنتاج الفاكهة. عند غرس أشجار الاجاص يجب اخذ هذا الامر بعين الاعتبار، وبالتالي يجب غرس صنفين في البستان من أجل تلقيح بعضهما البعض (أصناف المحاصيل الرئيسية والملقحات التي تزهر). وهذا امر ضروري لضمان التلقيح. ويقدم الجدول التالي بعض أنواع الأصناف المتوافقة في ما بينها :

جدول 5: الاصناف المتوافقة

الصنف الذي سيلقح	الصنف الذي سوف يتم تلقيحه
كوسيا Coscia	موريتني البكرية (Précoce Morettini)
موريتني البكرية Précoce Morettini	كوسيا Coscia
وليام Williams	د جيل غيبوط Dr Jules Guyot
د جيل غيبوط Dr Jules Guyot	وليام Williams
كونفرونس، Conférence	لويز بون دافرانس Louise Bonne d'Avranches
بوري هاردي Beurré Hardy وليام Williams	بان كراسان Passe Crassane
بوري هاردي Beurré Hardy	

ويمكن اختيار طريقتين للغرس من أجل دمج أصناف الملقحات مع الصنف الرئيسي.


الطريقة الاولى: إذا كان لكلا الصنفين نفس القيمة التجارية، يتم اختيار طريقة الزراعة المتناوبة للصنفين: حيث نقوم بغرس صفان من صنف الملقحات بالتناوب مع 6 صفوف من الصنف الرئيسي.

إعداد المراجع التقنية والتقنية الاقتصادية

الطريقة الثانية للزراعة هي إدراج شجرة الإاجاص الملقحة بين كل 5 إلى 8 أشجار من الصنف الرئيسي. و يجعل هذا النظام التلقيح أكثر فعالية حتى في ظل الظروف الجوية السيئة.

لاتلعب الرياح دورا أساسيا في تلقيح اشجار الإاجاص، و يتم التلقيح بواسطة الحشرات.

9. أمراض وحشرات شجرة الإاجاص

الاحتياطات الواجب اتخاذها خلال مكافحة الأمراض و الحشرات	
❖ اجراء المراقبة الحقلية للحد من انتشار الأمراض و الحشرات.	
❖ تبني اسس مكافحة البيولوجية ضد الأمراض و الحشرات.	
❖ عقلنة استعمال المواد الكيميائية (احترام الكمية المسموحة).	

يبين الجدول التالي أهم الأمراض و الحشرات التي تصيب شجرة الإاجاص

إعداد المراجع التقنية والتقنية الاقتصادية



جدول 6: أهم الأمراض والحشرات التي تصيب شجرة الإجاص

الصورة	العلاج	الأعراض	المرض/ الحشرة
	<p>المكافحة الوقائية:</p> <ul style="list-style-type: none"> • عند غرس البستان، من المستحسن تجنب المناطق الضعيفة التهوية، التي تؤدي إلى تطور المرض. • من المستحسن تجنب الإفراط في كمية الاسمدة الأزوتية. • عندما أصابة الأشجار، يجب إزالة الأغصان المصابة وحرقتها. • القضاء على البراعم المصابة خلال عملية التخفيف يساعد على السيطرة على المرض. <p>المكافحة الكيميائية:</p> <p>يتم معالجة الأشجار بمبيد يحتوي على الكبريت إذا كانت نسبة الإصابة ضعيفة. أما إذا كانت نسبة الإصابة يجب استعمال مبيد فطري من أجل الحد من انتقال الفطر إلى البراعم الجديدة.</p>	<p>يتميز هذا المرض بظهور بقع بيضاء على يطلق البراعم والأوراق والفواكه.</p> <p>يتسبب في هذا المرض الفطر بودوسفييرا ليوكوتريتشا.</p>	المرض/ الحشرة البياض الدقيقي
	<p>المكافحة الوقائية:</p> <ul style="list-style-type: none"> • عند سقوط الأوراق، يوصى بجمعها وحرقتها بالإضافة إلى الأغصان والأوراق والفواكه المصابة من أجل الحد من الإصابة في السنة التالية. • اختيار تقليم يسمح بتهوية الأشجار بشكل جيد، واعتماد نظام تسميد متوازن مع تجنب الإفراط في كمية الأزوت المستعملة.. <p>المكافحة الكيميائية:</p> <p>يتجلى العلاج الوقائي في استخدام مبيد فطري قبل إصابة الأوراق. وتتمثل الاستراتيجية العلاجية في رش مبيد للفطريات من عائلة مثبطات الإيثيلول الحيوي بعد بدء الأمطار الأولى (3 إلى 4 أيام).</p>	<p>يسبب الفطر فينتورا بيرينا هذا المرض. وتتجلى أعراض المرض في:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ على الأوراق: ظهور بقع غير النظامية ذات لون أسود على الجانب السفلي من الأوراق ❖ على الأغصان: بقع صغيرة أو مستديرة التي يمكن أن تسبب جفاف الأغصان. ❖ على الفواكه: تشوهات والشقوق عميقة 	التبقع (الجرب)

إعداد المراجع التقنية والتقنية الاقتصادية

الصورة	العلاج	الأعراض	المرض/ الحشرة
	<p>المكافحة الوقائية:</p> <ul style="list-style-type: none"> • إزالة جميع الأعضاء أو جزء من الأعضاء المصابة بقطعها على طول 50 سم إلى 100 سم تحت أماكن الأعراض المرئية ويجب حماية الجروح بمادة نحاسية (خليط بين النحاس والمعجون لائم الجروح "الماسستيك"). ويتم حرق الأجزاء المقطوعة في المحيط المباشر للقطعة الأرضية. • احترام تدابير النظافة من قبيل تعقيم أدوات التقليم واليدين • خفض من التطعيم الأولي بتجنب جروح فصل الشتاء من جهة بالمعالجة بمنتوج نحاسي أو منتوج آخر عند قرب بداية الإبراق؛ • إزالة الأزهار المتأخرة التي تظهر في فصل الصيف؛ • مراقبة الحشرات اللادغة والماصة (المن - البسيل - البق) والنحل وهذا ما سيساعد على الحد من انتشار العدوى؛ • منع تنقل خلايا النحل من موقع تم إعلانه مصابا إلى مناطق غير مصابة؛ • حرق النباتات المصابة (الزعرور، وشوك النار وما إلى ذلك)؛ • في حالة الوباء يجب اقتلاع جميع أشجار البستان وحرقها مباشرة. <p>السيطرة الكيميائية</p> <p>استخدام منتوج يحتوي على املاح النحاس .</p>	<p>تعتبر اللفحة النارية من بين الأمراض الفتاكة بأشجار الإاجاص. و ينتج هذا المرض عن الإصابة بالبكتيريا إروينيا أميلوفورا. تتمثل اعراض اللفحة النارية في:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ في فصل الربيع بعد الإزهار، تذبل الأجزاء النباتية: ذبول الأزهار المفتوحة، أوراق الباقات الزهرية و البراعم، ثم تجف و تصبح بنية- سوداء و كأنها محروقة بالنار بعد ظهور الأعراض، يجف العضو المصاب و ينحني على شكل قوس. ❖ يمكن للأغصان أن تجف بالكامل و تذبل في بضع أيام. ❖ تلتف الأجزاء النباتية، تنكمش الثمار الفتية و تبقى على الشجرة و هي من بين الأعراض التي تميز مرض اللفحة النارية ❖ تظهر الإفرازات الشمعية أولا على شكل إفرازات لينة ثم تصبح بنية و لزجة، مليئة بالبكتيريا و السكريات، تتدفق على سطح الأغشية المصابة و تطلق رائحة كريهة و مميزة. ❖ ينتشر المرض تدريجيا ليعم: الأغصان، الفروع المثمرة، فروع خشبية أو شجرية و الجذع. يلتوي اللحاء في الأماكن المصابة، حيث تتدفق منها قطرات من إفرازات شمعية صفراء تميل إلى اللون البني. تتلون الجهة الداخلية للحاء باللون الأحمر القاتم . ❖ عند قروب فصل الشتاء، يتوقف إنتشار النخر و تتشكل تقرحات على الأغصان، الفروع الخشبية و الجذع. 	اللفحة النارية
			


إعداد المراجع التقنية والتقنية الاقتصادية

الصورة	العلاج	الأعراض	المرض/ الحشرة
 	<p style="text-align: center;">فترات المعالجة</p> <ul style="list-style-type: none"> • يجب أن تكون الحماية دائمة خلال فترة الخطورة باستعمال المصائد الفيرومونية. يجب أن تتجاوز فترة العتبة (3 فراشات / اليوم). • نوعية مكافحة ضد الجيل الأول حاسمة لمكافحة الكاربوكابس. يمكن أن تتضاعف الخسائر بعشر مرات بين ج1 و ج2. • في حالة إذ ما تم التحكم في الجيلين الأول والثاني يكون الجيل الثالث أقل ضررا. لكن يجب أن تكون مراقبة البساتين دائمة (البحث عن الثقوب على الثمار) والإستمرار في مراقبة الحشرات باستعمال المصائد الفيرومونية إلى غاية الجني. <p style="text-align: center;">السيطرة الكيميائية</p> <p>إستراتيجية المكافحة : تركز المكافحة الكيميائية على بيولوجية الكاربوكابس و معطيات الرصد الجوي لتوقع فترات الطيران و مرحلة النمو النباتي للأشجار (مرحلة قابلية التأثر). يجب أن يكون لدى الفلاح مقياس إرتفاع و إنخفاض درجة الحرارة. وضع مصيدة / هك إنطلاقا من 10 أفريل و القيام بإحصاء و تسجيل عدد الحشرات التي تم القبض عليها يوميا.</p> <p>معالجة مضادة للبيوض: بدء المعالجة الأولى عند القبض على 3 فراشات/ المصيدة/ اليوم عند وصول درجات حرارة الشفق (طلوع وغروب الشمس) 18°م على مدار يومين، القيام بمعالجة مضادة للبيوض</p> <p>معالجة مضادة لليرقات</p> <p>عند القبض على 3 فراشات / المصيد/ اليوم، وصول درجة الحرارة إلى 90°م على أساس 10 بعد وضع البيوض (مجموع درجات الحرارة المعتدلة و اليومية - 10°م) = 90°م مما يعادل فترة التحضين: معالجة مضادة لليرقات .</p> <p>في حالة التأخر في وضع المصائد، يجب القيام أولا بمعالجة مضادة لليرقات للتخلص من اليرقات المتواجدة و إعادة المعالجة 3 أيام بعد إتباع الإستراتيجية المذكورة أعلاه باستعمال مبيدات مضادة للبيوض و اليرقات.</p>	<p>تسبب حشرة الكاربوكابس اضرار كبيرة بفاكهة الاجاص.</p> <p>تضع هذه الحشرة بيضها في شهر ماي. بعد فقس البيض تخترق الدودة الثمار.</p> <p>وصف الأعراض و الأضرار</p> <p>تظهر أنفاق لولبية الشكل مليئة بالفضلات في البداية و تتسع الأنفاق مع زيادة حجم اليرقة، تنتقل إلى ثمرة أخرى أو تحفر نفق ثاني. تسقط الثمار و تصبح غير صالحة للأكل. تتجه الأنفاق دائما نحو النواة لتقضي اليرقة على البذور.</p>	<p>الكاربوكابس</p> <p>(دودة التفاح و الإجاجص)</p>

إعداد المراجع التقنية والتقنية الاقتصادية

الصورة	العلاج	الأعراض	المرض/ الحشرة
 <p>Adulte de Psylle du poirier</p>  <p>Dégâts du Psylle du poirier sur fruit</p>	<p>المكافحة الوقائية</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ زراعة أشجار الإجاص بمناطق المتلائمة مع متطلباته ✓ الحفاظ على مسافة الغرس الكافية بين الأشجار لضمان تهويتها جيدا، ✓ انجاز التقليم المنتظم من أجل تهوية جيدة للأشجار. ✓ اعتماد تسميد متوازن مع تجنب الإفراط (الأزوت خاصة) ✓ استعمال الاعداء الطبيعية للقضاء على البسيل كالخنافس. <p>المكافحة الكيميائية</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ استعمال المبيدات الحشرية في بداية الموسم يمكن من السيطرة على البسيل ويتم ذلك برش المبيد الحشري الذي يحتوي على العنصر النشط الكلوربيريفوس الإيثيل او الإندوسلفان عندما يكون الطقس معتدلا ومشمسا، يمكن استخدام الزيوت البيضاء مباشرة بعد كسر البراعم للسيطرة على البسيل حيث يتم قتل البالغين عن طريق الاتصال المباشر. ✓ استعمال المبيدات الموسمية <p>عند حلول نهاية شهر ماي، اذالم تتم السيطرة على حشرة البسيل يجب استعمال المبيدات الموصى بها مثل سبينوساد، أبامكتين والبيرثرويد..</p>	<p>تعتبر حشرة البسيل (كاكوبسيلا بيري فويرستر، هوموبتيرا، بسيليداي) هو الآفة الرئيسية الثانية التي تهاجم شجرة الاجاص بعد حشرة الكاربوكابس.</p> <p>تمتص الحشرة النسغ من الأوراق والأفرع والثمار. تفرز مواد سامة أثناء التغذية تؤدي لظهور بقع بنية على الأوراق. وتؤدي لإتلاف البراعم الثمرية. وتساقط الأوراق وتشوه ثمار الموسم الحالي وتسبب تدني المحصول في الموسم التالي. تفرز البسيل الندوة العسلية على الأفرع والأوراق التي تؤثر على التبادل الغازي في الشجرة وتؤدي لانتشار فطر العفن الأسود الذي يسبب تشوه الأفرع والثمار فيصبح لونها أسود وتصبح غير صالحة للتسويق، يمكن تميز الإصابة بمشاهدة الندوة العسلية بشكل نقاط على كافة أجزاء تاج الشجرة وحولها تشاهد الحوريات ويمكن تمييز الحشرات الكاملة تطير من الشجرة بشكل قفزات ويتم التقاطها على مظلة الضرب..</p>	<p>البسيل</p>
	<p>يمكن مكافحة المن بواسطة المترسات و الطفيليات الطبيعية كالخنافس.</p> <p>يمكن للمبيدات المستعملة ضد حشرة البسيل في بداية الموسم الحد من حشرات المن.</p> <p>عند مكافحة الكيميائية يجب مراقبة البراعم الصغيرة لمعرفة وجود المن و عددها، و يجب القيام بالمكافحة مبكر و احترام الكميات الموصى بها حتى لا يتم القضاء على الاعداء الطبيعية لحشرة البسيل.</p>	<p>يوجد هذا النوع بالفصّة وخلال شهر أبريل تحط الأشكال الطائرة على براعم شجرة الاجاص. وتعد الأغراس الجديدة الأكثر تعرضا للمن الأسود حيث تميل الأوراق إلى الإصفرار وتجف.</p>	<p>المن الأسود</p>

إعداد المراجع التقنية والتقنية الاقتصادية

الصورة	العلاج	الأعراض	المرض/ الحشرة
	<p>تتم معالجة الشتاء بالزبوت البيضاء التي تكون موجهة للقضاء على الأشكال الشتوية للقملة. وبعد الإبراق ينصح باستعمال مبيد بيبل كل الشجرة بواسطة قاذفات الرشاش.</p> <p>المكافحة البيولوجية : يمكن مكافحة القملة بواسطة المترسات و الطفيليات الطبيعية كالخنافس. الا ان فعالية هذه الاعداء تقل عندما يكون عدد القملة مرتفعا.</p>	<p>هذه القملة يكون لها نمو شبه مستمر خلال السنة. هذه القملة هي لادغة وماصة لماء النبات "النسغ" وتقوم بحقن لعاب مسموم مما يؤدي إلى اجفاف الأعضاء المصابة. وفيما يخص الأغراس حديثة النشأة فإن هذه القملة تؤدي إلى ذبولها السريع. وفي حالة الهجوم القوي لهذه القملة تصاب الثمار مما يجعلها صعبة التسويق..</p>	<p>قملة سان خوسي</p>

10. الجني والتأمين والتخزين

10.1. الجني

تصل فاكهة الى النضج الأمثل للجني قبل تغير لونها حيث تبقى الثمار خضراء اللون و قاسية و يجب جنيها قبل ان تنضج على الشجرة. ويتم تحديد موعد الجني اعتمادا على مدى صلابة الثمار حيث تمتد فترة الجني من غشت الى اكتوبر حسب الاصناف. و يؤثر نضج الفاكهة عند القطف على قدرتها على التخزين و على جودتها النهائية

تكون فاكهة الإجاص عرضة للاصابة بالكدمات أثناء عمليات الانتقاء والمناولة. وتظهر على الفاكهة الأضرار المادية أو الميكانيكية مثل علامات الاحتكاك أو كدمات بسبب تأثير أو ضغط، لا تظهر تلك العلامات ذلك الوقت، ولكنها تظهر أثناء التخزين. يجب تجنب الإفراط في ملء السلال و الصناديق. يمكن تعبئة فاكهة الإجاص بضعة أيام في مكان باردمن اجل التخلص من حرارة الجني.

تشكل عملية الجني عبئا ثقيلًا على الفلاح حيث تتطلب هذه العملية منه:

- معرفة جيدة لمراحل نمو الفاكهة من اجل تحديد موعد الجني بشكل جيد.
- التقييم المناسب لإنتاجية البستان، من اجل تعبئة اليد العاملة الكافية للقيام بهذه المهمة و الادوات اللازمة.
- دقة كبيرة في تنظيم عملية الجني.

المعدات اللازمة لجني الإجاص هي:

- صناديق خشبية ثقيلة؛
- صناديق خفيفة مصنوعة من الخشب أو البلاستيك.
- صناديق التغليف الكبيرة من الخشب أو البلاستيك "باليت أو بالوكس"؛
- كيس الجني الذي يعلقه العامل.
- سلم الجني؛
- مقطورة الجرار لنقل الثمار

من اجل الحفاظ جودة ثمار الاجاص



- ❖ العمال المكلفون بالجني لا يجب أن يجروا الثمار وأفضل طريقة هي تدوير اليد. كما يجب عدم رمي الثمار بل وضعها بعناية في كيس أو سلة الجني.
- ❖ لا يجب تعريض الثمار لأشعة الشمس لمدة طويلة لكي لا تصاب بالتلف بضربات الشمس وهذا ما يجعلها غير قابلة للتخزين

10.2. تخزين الإجاص

غالبا ما نكون مضطرين إلى نقل الإجاص وبيعه بعيدا عن أماكن إنتاجه كما أن البيع يكون بشكل تدريجي وهذا ما يستلزم تخزين الثمار لمدة طويلة شيئا ما بين الجني والتسويق.

بالنسبة للتخزين متوسط وطويل الأمد من شهر إلى ستة أشهر فهناك ثلاثة طرق مستعملة:

• **التخزين في مكان مهوياً**

الثمار يتم وضعها في مكان مغلق بدون برد مصطنع. درجات الحرارة المنخفضة خلال الليل فقط هي التي تأخر من نضج الثمار. هذه الطريقة التقليدية تمكن من تخزين الإجاص من أسبوعين إلى شهرين.

• **التخزين في بيت بارد عادي**

يتم بالإحتفاظ بالثمار في مكان مغلق حيث يتم إنتاج البرد بشكل مصطنع. و الحرارة والرطوبة داخل غرفة التبريد هي التي تتحكم في التخزين.

ويتكون البيت البارد من بنية التحكم في الحرارة الثابتة ومجموعة التبريد وجهاز المراقبة والتنظيم.

• **التخزين بواسطة الهواء المراقب**

التخزين بواسطة الهواء المتحكم فيه يساعد على تخزين الإجاص لمدة أطول مقارنة مع التخزين في بيت بارد عادي وقد تختلف مدة التخزين حسب الأصناف حسب الأصناف

10.3. تليف الإجاص

هذه العملية تسعى إلى وضع الثمار في صنادق ورقية صغيرة أو في رزم من أجل نقلها وبيعها.

هذه الصنادق الورقية أو الرزم لها عدة وظائف:

- حماية الثمار؛
- نقل المنتج وتخزينه؛
- إشهار المنتج.

وتدل الملصقات على المنتج عن هوية المنتج وتاريخ إنتاجه ووزنه والمنتج...إلخ.



المكتب الوطني للإستشارة الفلاحية
Office National du Conseil Agricole

Siège : Avenue Mohamed Belarbi Alaoui – Rabat
Adresse postale : B.P : 6672 – Rabat Instituts
Tél : 0537.77.65.13
Fax : 0537.77.92.89
www.onca.gov.ma/

NOVEC
GROUPE CDG

Immeuble NOVEC, Park Technopolis 11 100, Sala El Jadida/ Rabat-Salé
Tél : 0537 576 800
Fax : 0537 566 741
www.novec.ma